

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 3/9/2021 12:33:47 PM
Subject: RE: Input aanpassingen onderwerpen en vragen/antwoorden COVID-19-Vaccinatie
Received: Tue 3/9/2021 12:33:48 PM

Dat moet nog worden uitgewerkt, ik zou dat nog niet aanpassen.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 13:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Input aanpassingen onderwerpen en vragen/antwoorden COVID-19-Vaccinatie

Hoi 5.1.2e

Een vraag: als je na de eerste vaccinatie besmet raakt met coronavirus, is ook dan een tweede vaccinatie niet nodig?

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

RIVM Stafeenheid Communicatie/
 Postbus 1
 3720 BA Bilthoven
 Tel.: 030- 5.1.2e
 Mobiel: 5.1.2e
www.rivm.nl
www.infectieziektenbulletin.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: dinsdag 9 maart 2021 10:37
To: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: Input aanpassingen onderwerpen en vragen/antwoorden COVID-19-Vaccinatie

Hoi 5.1.2e

Nav de GR adviezen heb ik even gekeken waar we onderwerpen moeten aanpassen. Het gaat om 3 webpagina's (werking, de vaccins en ziekten):

1 <https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vaccins/werking>

Kans op corona na vaccinatie

Na de eerste vaccinatie kan je nog corona krijgen omdat je afweer tegen het virus nog niet helemaal is opgebouwd. Na de tweede vaccinatie is de kans om ziek te worden veel kleiner omdat je beter beschermd bent. Het is daarom belangrijk om ook de tweede vaccinatie te halen.

Informatie over de effectiviteit van de vaccins staat op de pagina [De COVID-19-vaccins](#).

Twee vaccinaties

Je krijgt twee vaccinaties van hetzelfde merk vaccin. Maar als je per ongeluk de tweede vaccinatie van een ander merk krijgt, ben je toch beschermd. Je hoeft dan niet een derde vaccinatie te halen. Mocht je de tweede vaccinatie door omstandigheden eerder of later krijgen dan geadviseerd is, dan hoef je ook geen derde vaccinatie te halen.

Toevoegen aan bovenstaande teksten:

Mensen die al besmet zijn geweest met het coronavirus hebben voldoende aan één vaccinatie. Uit onderzoek blijkt dat de immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste een half jaar aanhoudt. Ook blijkt dat één vaccinatie binnen

6 maanden na besmetting de opgebouwde antistoffen flink verhoogd. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om mensen die minder dan zes maanden geleden positief zijn getest op corona één keer te vaccineren. <Met linkje naar advies GR: <https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/03/08/spoedvragen-covid-19-vaccinatie> >

2. <https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/covid19-vaccins>

Effectiviteit van de COVID-19-vaccins

Vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) en Moderna

Deze vaccins van zijn meer dan 90% effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 90% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. De vaccins zijn ook erg effectief bij volwassenen van 65 jaar en ouder. Uit de onderzoeken blijkt dat mensen die na een vaccinatie toch corona kregen, minder ernstig ziek werden.

Vaccin van AstraZeneca

Dit vaccin is 60-80% effectief in het voorkomen van ziekte door coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 60-80% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. Als er meer tijd zit tussen de eerste en tweede prik van Astra Zeneca is de bescherming beter. Uit de onderzoeken blijkt dat AstraZeneca net zo goed beschermt als Moderna en Pfizer tegen ernstige klachten als gevolg van COVID-19. Het meeste onderzoek bij Astra Zeneca is gedaan bij personen tussen de 18 en 55 jaar, maar de Gezondheidsraad verwacht dat het vaccin ook goed werkt bij oudere personen en adviseert om de groep van 60 tot en met 64 jaar nu als eerste met dit vaccin te vaccineren. Recent wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat AstraZeneca ook bij mensen boven de 65 jaar goed werkt. De Gezondheidsraad adviseert daarom om AstraZeneca ook voor die groep in zetten. + linkje naar GR advies: <https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/03/08/spoedvragen-covid-19-vaccinatie> 3) <https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vaccins/ziekte-en-medicijngebruik>

Als je ziek bent en een vaccinatie-afspraken hebt

Als je klachten hebt die kunnen passen bij corona (verkoudheidsklachten, verhoging/koorts benauwdheid, hoesten, verlies van smaak en reuk) kun je niet naar de vaccinatieafspraken komen. Blijf thuis, laat je testen en houd je aan de [beschermingsregels](#) totdat je de testuitslag hebt.

- Als blijkt uit de test dat je geen corona hebt, kun je gevaccineerd worden als je geen koorts (meer) hebt.
- Als blijkt uit de test dat je corona hebt, ga je in thuisisolatie en kun je later gevaccineerd worden als je weer beter bent. Je kunt dan gevaccineerd worden vanaf vier weken nadat je ziek werd.

Na een besmetting met corona hoef je maar één vaccinatie te halen. Maak een [nieuwe afspraak](#) voor de vaccinatie.

De afspraak voor de tweede vaccinatie kon niet doorgaan

Als je vaccinatie-afspraken niet door kon gaan, bijvoorbeeld omdat je ziek was, hoef je niet opnieuw te beginnen met de vaccinatieserie. De tweede vaccinatie wordt dan later gegeven. Na een besmetting met corona hoef je maar één vaccinatie te halen.

Maak een [nieuwe afspraak](#) voor de vaccinatie.

Kun jij de definitieve redactieslag doen, ook de webpagina met vragen-antwoorden checken (omdat daar hetzelfde moet komen), afstemmen met [5.1.2e](#) en publicatie door [5.1.2e](#)

Thanks!