

To: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e | @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e | @rivm.nl]
From: 5.1.2e | 5.1.2e
Sent: Thur 3/4/2021 3:29:45 PM
Subject: RE: 3 vragen van een HAP
Received: Thur 3/4/2021 3:29:46 PM

Dank je 5.1.2e Ben het ook helemaal met je eens

Van: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @rivm.nl>
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 15:28
Aan: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @rivm.nl>
CC: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @rivm.nl>
Onderwerp: RE: 3 vragen van een HAP

Ha 5.1.2e

Zie hieronder mijn antwoorden. Moet wel zeggen dat de HAP dit zelf ook kan opzoeken in de richtlijn. En vraag 1 is voor een professional ook wel een beetje kwalijk :

Groet 5.1.2e | 5.1.2e

From: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @rivm.nl>
Sent: woensdag 3 maart 2021 16:28
To: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @rivm.nl>
Subject: FW: 3 vragen van een HAP

Hi 5.1.2e ik heb 3 vragen van een HAP gekregen. Kan jij helpen met het beantwoorden?

1. Gevaccineerd en vervolgens Covidpositief, kan dit door vaccin komen?

Nee dat kan niet. Een PCR-test toont virusdeeltjes aan. Als je gevaccineerd bent krijg je antistoffen in je bloed maar geen levende virusdeeltjes.

2. Tweede prik uitgesteld ivm afwezigheid of COVIDbesmetting, heeft dit zin na bv. >8 weken?

Zie deze paragraaf in de richtlijn. Daarbij is het van belang zo dicht mogelijk op het geadviseerde interval te blijven zitten. Zie voor vaccinatie na COVID-19 punt 3.

- In de paragrafen met specifieke informatie per vaccin (5.2, 5.3 en 5.4) is expliciet toegevoegd dat, als de tweede vaccinatie buiten het geadviseerde interval valt – dus eerder of later is toegediend – de vaccinatieserie niet opnieuw hoeft te worden gestart. Het is niet nodig een derde vaccinatie te geven. Ook als er per ongeluk een tweede vaccinatie is toegediend met vaccin van een ander merk, hoeft er geen derde vaccinatie gegeven te worden.

3. Uitgangspunt na constatering positieve covid besmetting 4 weken na vaststelling alsnog vaccineren, tenzij er nog klachten zijn.

- Ja zie richtlijn hoofdstuk 4, contra-indicaties: Mensen die COVID-19 doorgemaakt hebben, kunnen veilig gevaccineerd worden met COVID-19-vaccin. De vaccinatie kan de al bestaande antistoffen mogelijk zelfs een boost geven. Om goed onderscheid te kunnen maken tussen klachten passend bij het doormaken van de ziekte en klachten veroorzaakt door de vaccinatie wordt wel een interval gehanteerd. De aanbeveling is daarom te wachten tot herstel en minimaal 4 weken na het begin van de symptomen de vaccinatie toe te dienen.

Groet, 5.1.2e

