

To: [redacted] 5.1.5 [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl]  
From: [redacted] 5.1.5  
Sent: Fri 3/26/2021 2:10:01 PM  
Subject: FW: advies tav vaccinatie als er reeds moderna is toegedient.  
Received: Fri 3/26/2021 2:10:02 PM

FYI

---

From: [redacted] 5.1.5 <[redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>  
Sent: vrijdag 26 maart 2021 14:20  
To: [redacted] 5.1.2e @meriant.nl' <[redacted] 5.1.2e [redacted]@meriant.nl>  
Subject: RE: advies tav vaccinatie als er reeds moderna is toegedient.

Geachte mevrouw [redacted] 5.1.2e

Bedankt voor uw bericht. De cliënt kunt u inderdaad aanmelden via het mobiele team 'Thuisvaccinatie'.

Hierbij de gegevens van Thuisvaccinatie: [redacted] 5.1.2e @[thuisvaccinatie.nl](mailto:thuisvaccinatie.nl)

Thuisvaccinatie heeft de volgende gegevens nodig: naam instelling, adres instelling, contactpersoon instelling, telefoonnummer contactpersoon, aantal personen, type vaccin en eerste/tweede vaccin.  
Bij vragen kunt u bellen naar: 0900 12 12 888 (optie 1). Als er persoonsgegevens worden meegestuurd dan kan dit per Zorgmail: E-mailadres: [redacted] 5.1.2e @[lms.lifeline.nl](mailto:lms.lifeline.nl) Zorgmail ID: [redacted] 5.1.2e

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

COVID-19 vaccinatie

---

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

---

T: [redacted] 5.1.2e  
W: <http://www.rivm.nl>

---

Van: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@meriant.nl>

Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 13:00

Aan: [redacted] 5.1.5 [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: advies tav vaccinatie als er reeds moderna is toegedient.

Hoi,

In de VVT krijgen wij Pfizer (Comirnaty) vaccin voor onze bewoners.

Nu hebben wij recent iemand opgenomen met een IBS.

Deze cliënt heeft thuis reeds 1 vaccin Moderna toegediend gekregen.

In de richtlijn wordt nog steeds geadviseerd niet de vaccins te combineren maar hoe kunnen wij deze cliënt dan volledig beschermen?

Kan dat via het mobiele team?

Zou het verschil maken als de cliënt AstraZeneca had gekregen?

Zelfs als we wel Comirnaty zouden toedienen is de interval met de komende vaccinatie veeg ronde te kort (<14 dagen) of met de 2<sup>de</sup> gift over nog eens 6 week wel erg lang.

Wat is jullie advies?

Met vriendelijke groet

[redacted] 5.1.2e

Zorggroep Alliade, Meriant

5.1.2e

--