

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [redacted]@rivm.nl]
From: LCI Voorwacht
Sent: Mon 3/15/2021 2:54:23 PM
Subject: FW: Isolatie immuungecompromitteerden
Received: Mon 3/15/2021 2:54:23 PM

Hoi [5.1.2e]

Eens om onderstaande te antwoorden?

Groeten, [5.1.2e]

Beste [5.1.2e]

In het stukje tekst in de COVID-19 richtlijn staat idd. gebruik van verschillende typen immuunsuppressiva bij auto-inflammatoire aandoeningen, dit wordt niet als cumulatief bedoeld.

In de richtlijn wordt bedoeld indien er sprake is van het gebruik van een immunosuppressivum bij auto-inflammatoire aandoeningen de persoon als **immuungecompromitteerd** wordt beschouwd m.b.t. Covid en duur isolatie (14 dagen).

Hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Clb)
 Postbus 1 (interne postbak 13)
 3720 BA Bilthoven

From: [5.1.2e] [5.1.2e] [redacted]@ggdzl.nl>
Sent: zondag 14 maart 2021 17:58
To: LCI Voorwacht <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: Isolatie immuungecompromitteerden

Beste voorwacht,

Onlangs werd de Covid-richtlijn rondom isolatie immuungecompromitteerden aangepast. In de huidige richtlijn wordt de combinatie van immunosuppressiva genoemd en immunosuppressiva na orgaan of stamceltransplantatie.

Voor indexen die alleen prednison, een ander corticosteroid of immunosuppressivum namen, gebruikten wij voorheen de richtlijn vaccineren van het LCI om te bepalen of iemand immuungecompromitteerd is of niet (https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2020-02/Chronisch%20inflammatoire%20aandoeningen_0.pdf). Hierin wordt vermeld dat er sprake is van immuungecompromitteerde toestand: bij inname prednison meer dan 14 dagen en > 20 mg prednison per dag (volwassenen) of bij een cumulatieve dosis > 700 mg. Indien prednison (eender welke dosis) in combinatie met een ander immunosuppressivum wordt gebruikt is er ook sprake van immuungecompromitteerde toestand.

Hierin worden patiënten die langdurig prednison/corticosteroiden nemen (>700 mg aaneengesloten gebruik of meer dan 14 dagen en >20mg/dag) of een hoge dosis methotrexaat of anti-TNF als immuungecompromitteerd beschouwd. Geldt dit ook voor de Covid richtlijn? Omdat hierin nu dus alleen de combinatie van 2 of meer immunosuppressiva wordt genoemd of na orgaan/stamceltransplantatie. Of moeten we ervan uitgaan dat indien er sprake is van het gebruik van slechts één immunosuppressivum (zoals hoge dosis prednison, anti-TNF of methotrexaat) dat de persoon als niet immuungecompromitteerd beschouwd wordt m.b.t. Covid en duur isolatie?

Uitvoeringsrichtlijn LCI:

1. *Immuungecompromitteerd: gebruik van immuunsuppressiva na orgaan- of stamcel/beenmergtransplantatie, patiënten met een gestoorde afweer t.g.v. een hematologische aandoening, tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie bij kanker, gebruik van verschillende typen immuunsuppressiva bij auto-inflammatoire aandoeningen, primaire immuundeficiënties, een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-celaantal <math><200/mm^3</math> en (pre)dialysepatiënten met ernstige nierinsufficiëntie. Bij (pre)dialysepatiënten is brede immuunsuppressie in dit stadium van nierziekte onafhankelijk van gebruik van immuunsuppressiva en is verlengde shedding aannemelijk (Lamarche 2019). Overige groepen patiënten die niet genoemd zijn in deze opsomming vallen niet onder immuungecompromitteerde personen in deze richtlijn. De afwezigheid van een (functionele) milt (asplenie of hyposplenisme) verlengt de isolatieduur niet.*
2. Van belang is dat patiënt al immuungecompromitteerd was en niet bijvoorbeeld prednison krijgt sinds COVID-19-diagnose.

Hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

ANIOS infectieziektebestrijding

Afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM)

GGD Zuid Limburg

5.1.2e

5.1.2e [@gqdzl.nl](mailto:) | www.gqdzl.nl

5.1.2e