

# Aanpassingen BCO bij 0-4 jarige en schoolgaande kinderen

Aanleiding per 1 juli:

0 tot en met 12 jaar: tot niemand meer **1,5 meter afstand** Ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

13 tot en met 17 jaar: **geen 1,5 meter afstand meer onderling. Wel afstand tot volwassenen.** Ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

## Huidig BCO bij een volwassene die positief getest is, blijft ongewijzigd

Type Contact	Omschrijving	Maatregelen		
		18 jr en ouder	Kind ≤ 12 jr	Kind 13-18 jr
Type 1 huisgenoten	huisgenoten	Thuisquarantaine 2 wk /monitoring	Thuisquarantaine 2 wk/monitoring	Thuisquarantaine 2 wk/monitoring
Type 2 overige nauwe contacten	Type 2a: <b>langer dan 15 minuten</b> op <b>minder dan 1,5 meter</b> afstand contact hadden  Type 2b: een hoogrisicoblootstelling (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) was van <b>korter dan 15 minuten</b>	Thuisquarantaine 2 wk/monitoring	Thuisquarantaine 2 wk, maar mogen naar school en sport/monitoring	Thuisquarantaine 2 wk/monitoring
Type 3 overige contacten	langdurig contact ( <b>langer dan 15 minuten</b> ) op <b>meer dan 1,5 meter</b> afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.	Werk/school geen monitoring	Naar school/sport geen monitoring	Naar school/ sport geen monitoring
Geen	-	-	-	-

## Huidig BCO bij een kind of jongere die positief getest is, **met voorstel in geel**

Type Contact	Omschrijving	Maatregelen		
		18 jr en ouder	Kind ≤ 12 jr	Kind 13-18 jr
Type 1 huisgenoten	huisgenoten	Thuisquarantaine 2 wk	Thuisquarantaine 2 wk	Thuisquarantaine 2 wk
Type 2 overige nauwe contacten	Type 2a: <b>langer dan 15 minuten</b> op <b>minder dan 1,5 meter</b> afstand contact hadden Type 2b: een hoogrisicoblootstelling (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) was van <b>korter dan 15 minuten</b>	Huidig: Thuisquarantaine 2 wk/monitoring  Voorstel: Thuisquarantaine 2 wk /monitoring alleen bij intensief contact met het jonge kind (0-6 jr) en anders werken toestaan	Huidig: Geen restricties en mogen naar school/sport /geen monitoring (worden beschouwd als type 3)  ? Gelijk trekken aan 13-18 jaar	Huidig: Thuisquarantaine 2 wk/monitoring  Voorstel: Overweeg thuisquarantaine 2 wk /monitoring alleen bij intensief contact. Overig: Geen restricties en mogen naar school/sport /geen monitoring (worden beschouwd als type 3)
Type 3 overige contacten	langdurig contact ( <b>langer dan 15 minuten</b> ) op <b>meer dan 1,5 meter</b> afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.	Werk/school geen monitoring	Naar school/sport geen monitoring	Naar school/ sport geen monitoring
Geen	-	-	-	-

## Contactonderzoek 0-12 jaar:

- Huisgenoten zijn type 1
  - ⇒ Maatregelen: thuisquarantaine 2 wk
- Kinderen/jongeren die intensief omgegaan zijn met het positieve kind in de BP (bijvoorbeeld logeerpattijtjes of zij die sliepen in dezelfde slaapruiimte op korte afstand op bijv. een jeugdkamp- niet op kindercentrum) zijn type 2.
  - ⇒ Maatregelen : informeren en zo nodig advies op maat (en evt. toch quarantaine instellen)
- Groeps/klasgenootjes, andere jongeren (bijvoorbeeld alle sportmaatjes, jeugdkampmaatjes etc). die vaak, maar kort in contact waren met het positieve kind in de BP zijn type 2.
  - ⇒ Maatregelen: informeren (en maatregelen conform type 3)
- Volwassenen (begeleiders, leraren) die intensief contact hadden met het positieve kind (in de BP) zoals bijvoorbeeld tijdens de verzorging van heel jonge kinderen op een kindercentrum of laagste groepen van primair onderwijs zijn type 2.
  - ⇒ Maatregelen: thuisquarantaine 2 weken niet werken
- Volwassenen (begeleiders, leraren die vaak, maar kort in contact waren met het positieve kind in de BP zoals bijvoorbeeld de leraar voor de klas zijn type 2.
  - ⇒ Maatregelen: informeren en werken op school toestaan
- Alle andere kinderen/ volwassenen op kindercentrum/ school, die sporadisch/mogelijk in contact zijn geweest met het positieve kind in de BP zijn type 3.
  - ⇒ Maatregelen: informeren.
- Overige: die geen contact met kind hadden (bijvoorbeeld andere klassen/groepen

## Contactonderzoek 13-17 jaar:

- Contacten van een positieve jongere worden uitgevraagd door de GGD:
- Huisgenoten zijn type 1
  - Maatregelen: thuisquarantaine 2 wk
- Kinderen/jongeren die intensief omgegaan zijn met de positieve jongere in de BP, bijvoorbeeld logeertpartijtjes of zij die slapen in dezelfde slaapzaal zijn type 2.
  - Maatregelen : informeren en zo nodig advies op maat (en evt. toch quarantaine instellen)
- Groeps/klas/jaar(laag) genoten, en jonge kinderen (bijvoorbeeld alle sportmaatjes, jeugdkampmaatjes etc) die vaak, maar kort in contact waren met de positieve jongere in de BP zijn type 2,
  - Maatregelen: informeren (en maatregelen conform type 3).
- Alle volwassenen (begeleiders/leraren) zijn in principe type 3, want zij houden >1,5 meter afstand
  - Maatregelen: informeren.
- Alle andere jongeren op school, die sporadisch/mogelijk in contact zijn geweest met de positieve jongere in de BP zijn type 3.
  - Maatregelen: informeren.
- Overige: die geen contact met de jongere hadden (bijvoorbeeld andere klassen/groepen)

**Vragen:**

**Is 'strengere' BCO op voortgezet onderwijs haalbaar/ wenselijk?**

**Zijn er scholenclusters gemeld bij de GGD?**

**Is de onderlinge transmissie tussen 13-18 jarige vergelijkbaar met jonge kinderen?**

**Is de transmissie van een 13-18 jarige naar een volwassene vergelijkbaar met jonge kinderen?**



## Data OSIRIS/HP Zone week 23-25

Leeftijd index	Aantal index patiënten	Aantal contacten	Positieve contacten	% positieve contacten
0 t/m 12	74	281	13	4,6%
13 t/m 17	47	163	10	6,1%
18+	1816	5467	551	10,1%
Totaal	1937	5911	574	9,7%

Leeftijd index	Leeftijd contacten	Aantal index patiënten	Aantal contacten	Positieve contacten	% positieve contacten
0 t/m 12	0 t/m 12	74	125	7	5,6%
	13 t/m 17		14	1	7,1%
	18+		142	5	3,5%
13 t/m 17	0 t/m 12	47	15	1	6,7%
	13 t/m 17		62	2	3,2%
	18+		86	7	8,1%
18+	0 t/m 12	1816	973	71	7,3%
	13 t/m 17		351	42	12,0%
	18+		4143	438	10,6%

NB Kleine aantallen in leeftijdsgroepen, onderrapportering contacten indien er sprake van secundaire transmissie is