

## Inzet en testbeleid medewerkers huisartsenpraktijk

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | Versie 3 april 2020 | Gezamenlijk advies van LHV, NHG en RIVM

### **Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 ( hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden de volgende vragen doorlopen:**

1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden?
2. Zo ja, thuisblijven tot 24 uur koortsvrij.
- 3.
4. Indien hoesten en/of neusverkoudheid blijven bestaan ook de volgende vragen doorlopen.
- 5.
6. Is het mogelijk dat de medewerker thuisblijft of de werkzaamheden aanpast zodat er geen significant contact is met patiënten? Dat wil zeggen:
  - medewerker werkt thuis OF
  - medewerker verricht alleen telefonische/ administratieve werkzaamheden OF
  - medewerker houdt 1,5 meter afstand van patiënt.
  - 
  - Zo ja, thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij of werkzaamheden aanpassen en algemene hygiënemaatregelen in acht nemen.
  - 
  - Zo nee: de medewerker **TESTEN**.
  - In afwachting van de uitslag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)\* gebruiken zodat de medewerker de patiënt niet besmet.

\* PBM om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld worden.

# Huisartsenpraktijk

Inzet en testbeleid medewerkers

