

## Inzet en testbeleid medewerkers huisartsenpraktijk

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | Versie 20 april 2020 | Gezamenlijk advies van LHV, NHG en RIVM

Terug naar [Algemene uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#)

### **Een medewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) kan GETEST<sup>1</sup> worden:**

Totdat de testuitslag bekend is:

- Medewerkers met koorts: thuisblijven
- Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven of anders persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)<sup>2</sup> gebruiken zodat de medewerker de cliënt niet besmet.

Als de testuitslag bekend is:

- Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
- Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.

<sup>1</sup> *Neem contact op met de werkgever voor de procedure rondom testen. De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio (zie <https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19>).*

<sup>2</sup> *PBM om te voorkomen dat de medewerker met klachten het virus overdraagt aan cliënten, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende cliënten). De handschoenen moeten per cliënt gewisseld worden.*

*NB Ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de cliënt worden de standaard PBM gedragen. Zie <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>.*

### Versiebeheer:

Het algemene testbeleid is aangepast omdat de testcapaciteit is uitgebreid. Hierdoor is het direct testen van medewerkers met klachten bovenaan komen te staan. De flowchart is vervallen omdat er geen toegevoegde waarde meer was.