

BIJLAGE OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN VAN DOCUMENT UITGANGSPUNTEN BUITEN HET ZIEKENHUIS T.O.V. VERSIE 17 AUGUSTUS 2020

Samenvoegen met document “Beleid PBM voor de wijkverpleging”

Beide documenten zijn samengevoegd tot één document. Op inhoud waren beide documenten grotendeels gelijk en er was een overlap in doelgroep waarop beide documenten zichten richtten. De doelgroep vindt nu alle informatie over PBM gebruik in één document.

Titel

Aan de titel zijn de woorden ‘bij verpleging, verzorging of medische behandelingen’ toegevoegd. Hiermee is een verduidelijking gekomen op welke (zorg)handelingen dit document zich richt en op welke handelingen niet.

Eerste alinea

In de eerste zin zijn de woorden “buiten het ziekenhuis” vervangen door “bij verzorging, verpleging of (para) medische behandelingen van personen met (een verdenking op) COVID-19 en het preventief gebruik van mondneusmaskers in een zorgsetting anders dan een ziekenhuis”. Hiermee is een verduidelijking gekomen op welke (zorg)handelingen dit document zich richt en op welke handelingen niet.

Het preventief gebruik van mondneusmasker is opgenomen vanuit [het advies van het OMT over preventief mondneusmasker gebruik](#). De op één na laatste zin geeft een verklaring hoe het RIVM uitgangspunten over dit onderwerp opstelt, en is ook terug te vinden op de website van het RIVM; <https://www.rivm.nl/toelichting-op-aanpassing-uitgangspunten-mondneusmaskers>

De laatste twee zinnen ‘Het is belangrijk om te beseffen dat niet ieder (risico)contact leidt tot een besmetting of een infectie van de zorgmedewerker of patiënt. Het risico is afhankelijk is van de hier bovengenoemde factoren’ is toegevoegd. Voor de doelgroep geeft dit achtergrondinformatie hoe zij de risico-inschattingen van het RIVM kunnen interpreteren.

Tweede alinea

De term “de algemene hygiëne richtlijnen” is vervangen door de term “de preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers”. Deze term wordt ook gebruikt [in LCI richtlijn COVID-19](#). De volgende twee maatregelen zijn hieraan toegevoegd:

- Zorgmedewerkers blijven thuis bij COVID-19 gerelateerde klachten
- [Gezondheidscheck](#) bij de patiënt (‘triage’) bij begin van de zorg

Deze twee preventieve maatregelen werden in het oude document ook benoemd onder situatie A en B.

Derde alinea Gebruik van PBM

Deze alinea is in de plaats gekomen voor de zin “Vanwege COVID-19 kan het nodig zijn om extra PBM te gebruiken”. Deze alinea geeft weer waarom en in welke context zorgmedewerkers PBM gebruiken.

Vierde alinea A. PBM ter bescherming van de medewerker bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19

De titel van de alinea is uitsluitend een tekstuele aanpassing

De eerste twee zinnen uit het oude document “Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek? Zo ja, wel PBM nodig” zijn verwijderd. De tekstuele inhoud komt respectievelijk terug in de titel en in de eerste alinea.

De zinnen “Indien een patiënt verdacht wordt van COVID-19 dient hij/zij zich zo spoedig mogelijk te laten testen. In afwachting van de testuitslag gaat de patiënt in isolatie op de kamer of in de woning. De zorgmedewerker gebruikt PBM vanaf het moment dat hij/zij de kamer of ruimte waar de patiënt met (verdenking op) COVID-19 verblijft betreedt” zijn toegevoegd als een verduidelijking op de situatie A waarin de zorgmedewerker zich begeeft.

De opsomming van PBM die de zorgmedewerker dient te gebruiken zijn in het nieuwe document puntsgewijs weergegeven voor een beter overzicht.

De zin “ PBM is niet nodig wanneer de afstand tot de patiënt meer dan 1,5 meter is” is verwijderd. Conform [de adviezen van het OMT over preventief gebruik van mondneusmaskers](#) en [het document van de Federatie van Medische Specialisten over gebruik van PBM in \(poli\)klinische setting](#) en na overleg met de beroepsgroepen voor de langdurige zorg V&VN, Verenso en NVAVG is besloten om PBM te adviseren bij patiënten met (een verdenking op) COVID-19 ongeacht de afstand tot de patiënt.

De zin “LET OP: Bij aerosolvormende handelingen (medische procedures) is het nodig een FFP2 mondneusmasker te dragen. De Federatie Medisch Specialisten heeft een overzicht van deze aerosolvormende handelingen gepubliceerd. Voorbeelden zijn uitzuigen van de longen en intubatie” is toegevoegd. De link naar het document van FMS is direct opgenomen in het document. In het oude document was dit indirect via de link naar preventieve maatregelen zorgmedewerkers uit de LCI richtlijn COVID-19. Ook zijn er twee voorbeelden van aerosolvormende handelingen benoemd die vaak voorkomen in de langdurige zorg ter verduidelijking voor de doelgroep.

Vijfde alinea B. PBM ter bescherming van de patiënt bij een medewerker die onbeschermd nauw contact heeft gehad met een persoon met COVID-19*

De zin “De symptomen passend bij COVID-19 zijn, staan benoemd in de LCI richtlijn COVID-19, https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid” is extra toegevoegd ter verduidelijking op welke symptomen zorgmedewerkers moeten letten.

De tekst “Voor het beleid bij een zorgmedewerker die een huisgenoot heeft of een nauw contact is van een voor COVID-19 positief getest persoon en een zorgmedewerker die terugkeert uit een risicogebied/-land, wordt verwezen naar Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis” is verwijderd en vervangen door de tweede en derde alinea. Deze informatie

uitgebreider, en de informatie over doorwerken tijdens een quarantaine periode is als aanvulling opgenomen. Het oude document bevatte deze informatie niet.

Zesde alinea C. Preventief gebruik van PBM bij verhoogde besmettingsgraad in de omgeving

Deze alinea is in zijn geheel toegevoegd naar aanleiding van [het OMT-advies over preventief mondneusmaskergebruik in de zorg](#) en op basis van onderstaande documenten:

- [Preventief gebruik van mondneusmaskers door zorgmedewerkers in de langdurige zorg](#)
- [Leidraad Persoonlijke bescherming in de \(poli\)klinische setting van de Federatie Medische Specialisten](#)

De adviezen zijn conform de adviezen die volgen uit deze documenten en daar waar nodig aangevuld met voorbeelden van zorgsettings waarop de adviezen van toepassing zijn.

Zevende alinea Toelichting verschillende typen medische mondneusmaskers en face shields

Deze alinea is als aanvulling op de uitgangspunten geschreven om de doelgroep te informeren welke type mondneusmasker en faceshields er in gebruik zijn.

BIJLAGE OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN DOCUMENT BELEID PBM VOOR DE WIJKVERPLEGING T.O.V. VERSIE 29 MEI 2020

Samenvoegen met document “Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis”

Beide documenten zijn samengevoegd tot één document. Op inhoud waren beide documenten grotendeels gelijk en er was een overlap in de doelgroep waarop beide documenten zichten richtten. De doelgroep vindt nu alle informatie over PBM gebruik in één document. Hieronder wordt een toelichting gegeven op verwijderingen en wijzigingen die uitsluitend van toepassing zijn op het oude document Beleid PBM voor de wijkverpleging. Tekstuele aanvullingen in het nieuwe document staan weergegeven bij de wijzigingen die zijn aangebracht bij het document uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis.

Titel

Aan de titel zijn de woorden ‘bij verpleging, verzorging of medische behandelingen’ toegevoegd. Hiermee is een verduidelijking gekomen op welke (zorg)handelingen dit document zich richt en op welke handelingen niet.

Eerste alinea

De tekst uit het oude document is verwijderd en vervangen door nieuwe tekst. Hiermee is verduidelijking op welke (zorg)handelingen dit document zich richt en op welke handelingen niet. Het preventief gebruik van mondneusmasker is opgenomen vanuit het advies van het OMT over preventief mondneusmasker gebruik. De genoemde maatregelen uit het oude document die onder de “veilige vijf adviezen voor de thuiszorg” vallen, zijn geïntegreerd onder de preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers.

De zin uit het oude document “Het uit voorzorg gebruiken van PBM bij patiënten die geen (verdenking op) COVID-19 hebben is niet nodig” is verwijderd, omdat dit niet meer conform de huidige adviezen is, zie de uitleg bij de tweede alinea hieronder.

Tweede alinea Uitvoering maatregelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19

De tekst onder het kopje “Zorgverlening bij persoonlijke verzorging/ lichamenlijk onderzoek” is met enkele tekstuele wijzigingen ondergebracht bij de vierde alinea A “PBM ter bescherming van de medewerker bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19” van het nieuwe document.

De tekst onder het kopje “Handelingen op meer dan 1,5 meter afstand van de patiënt” is verwijderd, omdat dit niet meer conform de huidige [adviezen van het OMT over preventief gebruik van mondneusmaskers](#) en [het document van de Federatie van Medische Specialisten over gebruik van PBM in \(poli\)klinische setting](#) is. Na overleg met de beroepsgroepen voor de langdurige zorg V&VN, Verenso en NVAVG is besloten om PBM te adviseren bij patiënten met (verdenking op) COVID-19 ongeacht de afstand tot de patiënt.

Derde alinea Maatregelen bij een medewerker met klachten

De tekst van deze alinea is met tekstuele wijzigingen ondergebracht bij de vijfde alinea B “PBM ter bescherming van de patiënt bij een medewerker die onbeschermd nauw contact heeft gehad met een persoon met COVID-19*”.

Vierde alinea Tabel persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze tabel is in het nieuwe document opgenomen onder de vierde alinea A “PBM ter bescherming van de medewerker bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19” van het nieuwe document met een link in de zin “Voor nadere informatie aan welke eisen de PBM moeten voldoen zie ook de tabel in paragraaf 'Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers in de richtlijn”.