

# Inzet en testbeleid medewerkers huisartsenpraktijk

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | Versie 10 april 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina) | Gezamenlijk advies van NHG, LHV en RIVM

*Terug naar [Algemene uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#)*

**Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 ( hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden de volgende vragen doorlopen:**

1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden en/of neusverkouden en/of koorts?


**Zo ja:** de medewerker na minimaal bestaan van 24 uur klachten, **TESTEN**. Indien fit genoeg om test te laten afnemen.

2. **Bij koorts:** in afwachting van de test thuisblijven

3. **Bij verkoudheid en/of hoesten:**


In afwachting van de uitslag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)\* gebruiken zodat de medewerker de patiënt niet besmet.

*\*PBM om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld worden.*



## Huisartsenpraktijk

Inzet en testbeleid medewerkers



## Versiebeheer

- 03-04-2020: Aangepast op basis van het gewijzigde testbeleid, waarbij er meer mogelijkheden zijn om zorgmedewerkers te testen.
- 25-03-2020: Eerste versie.

[Facebook](#)[Twitter](#)[LinkedIn](#)[Email](#)[Print](#)

## Service

- [Archief](#)
- [Contact](#)
- [Naar website RIVM](#)
- [RIVM op Facebook](#)
- [RIVM op Twitter](#)