

Inzet en testbeleid verloskundigen en kraamzorg

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | Versie 7 april 2020 | Gezamenlijk advies van KNOV en RIVM

Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden de volgende vragen doorlopen:

1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden?
Zo ja, thuisblijven tot 24 uur koortsvrij.

Indien hoesten en/of neusverkoudheid blijven bestaan ook de volgende vragen doorlopen.

2. Kan een andere, niet-zieke medewerker de directe patiëntenzorg overnemen?
Zo ja:
 - medewerker werkt thuis; OF
 - medewerker verricht alleen telefonische/ administratieve werkzaamheden; OF
 - medewerker houdt 1,5 meter afstand van patiënt.Zo nee: de medewerker **TESTEN**.
In afwachting van de uitslag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)* gebruiken zodat de medewerker de patiënt niet besmet.

* PBM om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld worden.

Verloskundigen en kraamzorg

Inzet en testbeleid medewerkers

