

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers ambulancedienst

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | Versie 10 april 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina) | Gezamenlijk advies van AZN en RIVM

Terug naar [Algemene uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#)

In aanmerking nemende dat:

- ambulancepersoneel (rijdienst en meldkamer ambulancezorg) als kritische zorgmedewerkers zijn benoemd in het kader van testbeleid;
- zo goed als alle directe zorgverlening binnen 1,5 meter van de cliënt plaatsvindt;

wordt een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) GETEST¹ (NB testen heeft pas zin als er minstens 24 klachten zijn)

In afwachting van de uitslag:


- Medewerkers (rijdienst en meldkamer) met koorts: thuisblijven
- Medewerkers (rijdienst) zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven of anders persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)² gebruiken zodat de medewerker de cliënt niet besmet.
- Medewerker (meldkamer) zonder koorts: de zorgmedewerker houdt tenminste 1,5 meter afstand van collega's.
-
- Indien de test negatief is: hervat werkzaamheden met algemene hygiënemaatregelen, bij progressieve klachten hertesten overwegen.
- Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.

¹ Testen worden uitgevoerd door de GGD.

² PBM om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld worden.

Zorgmedewerkers ambulancedienst

Inzet en testbeleid medewerkers



Ambulancedienst

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

