

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers ambulancedienst

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | Versie 7 april 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina) | Gezamenlijk advies van AZN en RIVM

Terug naar [Algemene uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#)

In aanmerking nemende dat:

- ambulancepersoneel (rijdienst en meldkamer ambulancezorg) als kritische zorgmedewerkers zijn benoemd in het kader van testbeleid;
- zo goed als alle directe zorgverlening binnen 1,5 meter van de cliënt plaatsvindt;

worden bij een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) de volgende vragen doorlopen:

1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden?
Zo ja: thuisblijven tot 24 uur koortsvrij.
Zo nee: ga naar vraag 2.
2. Is het mogelijk dat de zorgmedewerker thuisblijft?
Zo ja: thuisblijven tot 24 uur na verdwijnen klachten.
Zo nee: ga naar vraag 3.
3. Is het mogelijk dat de zorgmedewerker de werkzaamheden tijdelijk aanpast, zodat er geen significant contact is met patiënten, noch met andere kritische zorgmedewerkers?
Zo ja : zorgmedewerker verricht binnen de RAV andere werkzaamheden tot 24 uur na verdwijnen klachten. NB. Reinigen en desinfecteren van een ambulance zijn NIET aangewezen als andere werkzaamheid binnen de RAV. De zorgmedewerker houdt tenminste 1,5 meter afstand van de patiënten en kritische zorgmedewerkers.
Zo nee : ga naar vraag 4.
4. Is het voor de continuïteit van zorg noodzakelijk is dat de ambulancezorgmedewerker (rijdienst, meldkamer) zorg blijft verrichten?
Zo ja: zorgmedewerker testen.¹
 In afwachting van de uitslag van de test:
 - In de rijdienst draagt de zorgmedewerker bij contact met kwetsbare patiënten persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM)², zodat de ambulancezorgmedewerker de patiënt niet besmet.
 - Op de meldkamer houdt de zorgmedewerker tenminste 1,5 meter afstand van collega's.
 Na *positieve testuitslag*: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.
 Na *negatieve testuitslag*: hervat werkzaamheden, bij progressieve klachten hertesten overwegen.
Zo nee: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.

¹ Testen worden uitgevoerd door de GGD.

² PBM bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de zorgmedewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld worden.

Ambulancedienst

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

