

Operationalisatie testbeleid patiënten met verdenking op Covid

18/03/2020

Doel

Het testbeleid zich op het identificeren van patiënten met COVID-19 in ziekenhuizen en instellingen voor ouderenzorg om adequate isolatiemaatregelen te regelen bij opname, en het vroegtijdig opsporen van clusters in instellingen.

- Buiten zorginstellingen

Het testen van patiënten op COVID-19 heeft geen meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg in de thuissituatie. Het verandert het behandelbeleid niet. Zorgverleners dienen bij een patiënt verdacht voor COVID-19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebruiken. Mocht een patiënt met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar het ziekenhuis zal testen in het ziekenhuis gedaan worden.

Indien huisarts in de thuissituatie, in uitzonderlijke gevallen, toch diagnostiek wil inzetten naar COVID-19, dan dient hij/zij dit zelf regelen, zo nodig in overleg met het lokale laboratorium en/of GGD.

(Afgestemd met OMT/NHG)

Instellingen voor ouderenzorg

Doel: vroegopsporen, vroege maatregelen

De eerste 1-2 patiënten o.b.v. klinische inschatting klachtenpatroon door specialist ouderenzorg

Afgestemd met VERENSO

- Ziekenhuizen

Patiënten met luchtwegklachten bij opname of ernstig beeld (op zaal/op IC) (conform beleid ziekenhuizen)

Contacten (medepatiënten) bewezen cases conform beleid ziekenhuis