

## Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

### Geestelijke Gezondheidszorg

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | Versie 8 april 2020

#### Uitgangspunt:

- De inzet van essentiële zorgmedewerkers dient zo optimaal mogelijk te zijn. Een essentiële medewerker is iemand die niet of nauwelijks vervangbaar is en waarbij door uitval de continuïteit van zorg in het gedrang komt.
- Prioriteit voor testen ligt bij de intramurale GGZ en de crisisdienst en voor zorgmedewerkers die werken met lichamelijk kwetsbare of oudere personen.

#### Bij een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden de volgende vragen doorlopen:

1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden?  
Zo ja: thuisblijven tot 24 uur koortsvrij.
2. Is de medewerker 24 uur koortsvrij én
  - a) zijn alle klachten van hoesten en neusverkouden verdwenen?  
Zo ja. Medewerker kan werken.
  - b) houden de klachten van hoesten en/of neusverkoudheid aan?  
Zo ja: bij voorkeur thuiswerken tot 24 uur na verdwijnen klachten.
3. Is het mogelijk dat de medewerker thuisblijft of de werkzaamheden aanpast zodat er geen significant contact is met cliënten? Dat wil zeggen:
- 4.- medewerker werkt thuis OF
- 5.- medewerker verricht alleen telefonische of administratieve werkzaamheden OF
- 6.- medewerker houdt minstens 1,5 m afstand van cliënt.  
Zo ja: thuiswerken tot 24 uur klachtenvrij of werkzaamheden aanpassen.
7. Werkt de medewerker met lichamelijk kwetsbare of oudere personen?
8. Zo ja: de medewerker **TESTEN**<sup>1</sup>. In afwachting van de uitslag van de test persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM)<sup>2</sup> gebruiken, zodat de medewerker de cliënt niet besmet.
9. Betreft het een essentiële zorgmedewerker, die werkt met lichamelijk gezonde personen?
10. Zo ja: de medewerker **TESTEN**<sup>1</sup>. In afwachting van de uitslag van de test algemene hygiënemaatregelen in acht nemen.
- 11.

<sup>1</sup> De indicatie voor het testen wordt afgegeven door de bedrijfsarts.

<sup>2</sup> PBM om te voorkomen dat de medewerker met klachten het virus overdraagt aan cliënten, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende cliënten). De handschoenen moeten per cliënt gewisseld worden.

NB Ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de cliënt worden de standaard PBM gedragen.

Zie <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>.

# Geestelijke Gezondheidszorg

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

