

## Indicaties voor diagnostiek

### Testbeleid personen met klachten passend bij COVID-19

Hieronder het testbeleid vanaf 25 maart 2020 bij personen met klachten passend bij een COVID-19-infectie.

Welke SECTOR	Welke PATIËNTEN	Doel
<b>ZIEKENHUIZEN</b>	Patiënten met (ernstige) acute luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuele patiëntenzorg</li> <li>- Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers</li> </ul>
<b>BUITEN HET ZIEKENHUIS</b>		
<b>Huisartsenzorg</b>	In principe niet  Uitzondering: patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg) i.v.m PBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg</li> </ul>
<b>GGD'en</b>	In principe niet  Uitzondering: indien nodig voor bestrijdingsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestrijdingsmaatregelen zoals contactonderzoek in regio's waar wijdverspreide transmissie nog niet is vastgesteld</li> </ul>
<b>Thuiszorg</b>	In principe niet  Uitzondering: indien nodig bij patiënt met grote zorgbehoefte i.v.m. PBM indicatie door huisarts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg</li> </ul>
<b>Verpleeghuizen (allemaal lichamelijk kwetsbare patiënten)</b>	1 á 2 patiënten per afdeling of locatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (cohortering of isolatie)</li> <li>- Isolatie en bescherming verpleeghuispopulatie en medewerkers</li> <li>- Individuele patiëntenzorg</li> <li>-</li> </ul>

<b>Instellingen voor gehandicaptenzorg</b>	1 á 2 patiënten per afdeling of locatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (cohortering of isolatie)</li> <li>- Isolatie en bescherming verpleeghuispopulatie en medewerkers</li> <li>- Individuele patiëntenzorg</li> </ul>
<b>NIVEL huisartsenpeilstations</b>	Alle patiënten met griepachtige klachten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveillance</li> </ul>

#### Buiten het ziekenhuis

Buiten het ziekenhuis heeft het testen van patiënten met klachten en symptomen passend bij COVID-19 geen meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg. Het verandert het behandelbeleid niet. Indien een huisarts in de thuissituatie, in uitzonderlijke gevallen, toch diagnostiek wil inzetten naar COVID-19, dan dient hij/zij dit zelf te regelen; zo nodig in overleg met het lokale laboratorium en/of de GGD.

In instellingen zoals verpleeghuizen, woonzorgcentra en andere plekken waar veel kwetsbare mensen bij elkaar wonen, wordt diagnostiek ingezet om introductie vast te stellen. Dit is van belang voor het verpleegbeleid in de instelling. Meestal volstaat het dan om bij 1 of 2 bewoners diagnostiek in te zetten.

#### In het ziekenhuis

Diagnostiek bij patiënten vindt plaats op geleide van het beleid in het betreffende ziekenhuis.