

17-03-2020

Testbeleid zorgmedewerkers INTRAMURAAL en EXTRAMURAAL**Doel: Voorkomen transmissie van COVID-19 tussen zorgmedewerkers en hun cliënten personen.**

Sturing voor continuïteit van zorg door gezonde zorgmedewerkers tijdens COVID-19 epidemie, bescherming kwetsbare populatie, met schaarste voor PBM en beperkte testcapaciteit.

Kader:

- Mitigatie fase: Maatregelen
 - Social distancing, vooral >70 en kwetsbare personen
 - Blijf thuis vanaf verkoudheid.
 - Verdacht COVID-19 bij koorts en hoesten
 - Testen COVID-19 allien op indicatie(door huisarts, evt. GGD evt. ARBO), als dit het (be)handelingsperspectief stuurt.
- Risico op infectie zorgmedewerkers: werk > thuis, mogelijke ongemerkte blootstelling is.
- Risico op overdracht kwetsbare personen: ja
- Verwachting: Toenemende aangescherpte (her)prioritering van testbeleid

Doelpopulatie:

Diverse categorieën zorgmedewerkers en beleidsperspectieven:

- Intramuraal versus extramuraal
- Goed werkgeverschap (arbo) versus zorgplicht
- Cruciale zorgmedewerkers versus niet-cruciale zorgmedewerkers (nader definiëren)
- Zorgmedewerkers die zorg verlenen aan gezonde personen/ gezonde 'patiënten' versus (kwetsbare) personen of kwetsbare patiënten.
- Gezonde zorgmedewerkers versus kwetsbare zorgmedewerkers (of in directe omgeving)
- Handelingsperspectief bij testen: individueel versus populatie niveau.

INTRAMURAAL

VOLGT nog (**5.1.2e** en **5.1.2e**), zie stroomschema

EXTRAMURAAL

Cruciale zorgmedewerkers (huisarts, verpleeghuis, thuiszorg, verloskundige)

- Werken door bij lichte luchtwegklachten zonder BPM, ook als zij in contact zijn geweest met (verdachte) COVID-19 patiënten, *tenzij zij zorg verlenen aan (kwetsbare) personen of kwetsbare patiënten*. Zij dragen zelf BPM/ mondkapje wanneer zij direct fysieke handelingen met cliënten verrichten. Actief 2x daags temperatuur monitoren! **Laagdrempelig testen, doorwerken (in afwachting van uitslag met BPM/mondkapje). Reden van testen: om uit te sluiten dat het COVID is.**
- UITVAL: Blijven thuis bij koorts >38 graden. tot één dag nadat zij niet meer hoesten en geen koorts hebben, of als zij een positieve COVID-19 hebben.

Niet-cruciale zorgmedewerkers (overig bijvoorbeeld fysiotherapeut)

- Blijven thuis bij enkel verkoudheid of hoesten tot één dag nadat zij geen klachten meer hebben.

Kwetsbare zorgmedewerkers mijden contact met cliënten met luchtwegklachten of dragen BPM.

- Laagdrempelig testen bij luchtwegklachten
-
-

-