

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
Ziekenhuis	Patiënten met (ernstige) acute	Ziekenhuismedewerkers	<ul style="list-style-type: none">• Individuele

	luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Huisartsenzorg	Patiënten uit de risicogroep* Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg/hospice) conform uitwerking NHG	Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg/ hospice • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Thuiszorg (voornamelijk lichamelijk kwetsbare patiënten)	Niet van toepassing Indicatiestelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)	Thuiszorgmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden • PBM-gebruik • Testen** • 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Verpleeghuis (uitsluitend lichamelijk kwetsbare patiënten)	Patiënten verdacht voor COVID-19 Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn VERENSO	Verpleeghuismedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Infectiepreventie: isolatie of cohortering • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Gehandicaptenzorg (woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)	Patiënten verdacht voor COVID-19 Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn VERENSO	Zorgmedewerkers met klachten : <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Infectiepreventie: isolatie of cohortering • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

			<ul style="list-style-type: none"> •
Intramurale GGZ patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar mogelijk gedragsproblemen	Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn GGZ-NL	Medewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek: <ul style="list-style-type: none"> • PBM-gebruik • Testen 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten • Individuele patiëntenzorg • Bescherming lichamelijk kwetsbare personen tegen besmette medewerker
Instellingen voor Jeugdzorg mogelijk gedragsproblemen	Patiënten uit de risicogroep* In overleg met GGD	Medewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden 	<ul style="list-style-type: none"> • Infectiepreventie: isolatie of cohortering •
GGD'en	Patiënten verdacht voor COVID-19 (indien nodig voor bestrijding) Zorgmedewerkers met klachten	GGD-medewerkers met klachten <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis
Ambulancezorg	Niet van toepassing Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis	Medewerkers met klachten <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Verloskundigen	Niet van toepassing Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis	Verloskundigen met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

* Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

** indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus!