

AGENDA TASFORCE ZORG

DD 23-11-20

1. BINNENGEKOMEN VRAGEN:

Organisatie	Vraagsteller	Vraag	Antwoord
Nederlandse GGZ	5.1.2e	Uit de procedure begrijp ik dat een medewerker met klachten, die een negatieve uitslag heeft op de antigeentest, daarna nog een PCR-test moet ondergaan om die negatieve uitslag te bevestigen. Kan de betrokken medewerker in dat geval, met gebruik van PBM wel aan het werk tijdens het wachten op de uitslag van de PCR-test of dient deze dat, net als wanneer er alleen een PCR-test is gedaan, thuis afwachten?	5.1.2e <i>belt vraagsteller</i>
College Perinatale zorg Min VWS KNOV	5.1.2e	- Kan een zwangere verloskundige (28 weken +) bijvoorbeeld wanneer zij chirurgisch mondneusmasker type IIR draagt + handhygiëne en/of handschoenen draagt, wel zorg verlenen aan NON covid cliënten? - Kan een zwangere verloskundige (28 weken +) bijvoorbeeld wanneer zij chirurgisch mondneusmasker type IIR draagt + handhygiëne en/of handschoenen draagt, wel kortdurend (<15	5.1.2e <i>Aan</i> 5.1.2e <i>voorgelegd</i>

		min) zorg verlenen aan NON covid cliënten?	
Kennisinstituut Mondzorg	5.1.2e 5.1.2e	<p>. De literatuurlijst (artikelen uit maart / april / mei) op de aangehaalde pagina was ons al bekend omdat wij begin april met de eerste versie van de Leidraad Mondzorg Coroa aan het werk waren. Wij konden toen al niet herleiden dat de presymptomatische fase het meest besmettelijk is. En nu nog steeds niet eigenlijk. Dus als die mogelijkheid er is om contact te hebben, dan zouden wij daar zeer bij geholpen zijn!</p> <p>1. Besmettelijkheid in de pre-symptomatische fase. Het RIVM stelt op haar pagina (https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco) 'Dit advies is gebaseerd op de bevinding dat geïnfecteerde personen het meest besmettelijk zijn vlak voordat er klachten zijn. Dit is de pre-symptomatische episode die doorgaans 1-3 dagen (72 uur) duurt. Een index die bij het moment van testen geen klachten heeft is mogelijk pre-symptomatisch.</p> <p>* Onze vraag is hoe wij hier het meest</p>	<p>Vraag voorgelegd aan 5.1.2e antwoord ter info, vraagsteller kon hier verder mee; Het huidige document op de RIVM site is van voor de zomer en op dit moment nog niet geactualiseerd, ik kan nu ook nog niet aangeven wanneer dit gaat gebeuren. Op dit moment gaat men ervanuit dat in de 2 dagen tot start symptomen (presymptomatische fase) en in eerste 5 dagen van klachten (symptomatische fase) de viral load het hoogst is en dat er daarom het hoogste risico is op transmissie. Hieronder de link naar de bijbehorende bron. Ik hoop dat het KIMO hier mee voldoende geholpen is. Vriendelijke groeten, 5.1.2e https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3862</p> <p>Nog navragen wanneer huidige document wordt herzien op site? Wellicht met info van 5.1.2e</p>

		besmettelijk moeten lezen: in termen de viral load? Of juist in termen van gedrag? Welke literatuur ondersteunt deze stelling? Het is voor ons triage-model van wezenlijk belang antwoord te krijgen op deze vraag.	
--	--	---	--

2. Herzien Wmo document *Commentaar meeleezronde 1 (geredigeerd document volgt)*

AVG	5.1.2e	- eten/ drinken met cliënten of eten/ drinken apart vd cliënten
	5.1.2e	- kunnen Wmo medewerker goed omgaan met opgesomde pbm (reinigen etc) - twijfel over faceshield gebruik, klopt het en onduidelijk. Tabel van maken
VGN		- Sluit niet aan bij pbm buiten zkh; bijlae een optie? - Triage explicieter benoemen; wering cliënten. Triage mn bij dagbesteding inzetten en zo min mogelijk pbm - Testebeleid verschil PCR/ sneltest - Alternatieve ondersteuning - Nadelen masker gebruik, kritisch afwegen conform OMT advies - Zorg tot explosief gebruik PBm, verkeerd gebruik etc moet een afweging va het team zelf zijn
Zorgthuis		- Instructie/ beleid voor sneltesten invoegen - Mag een hbh medewerker in 'fastlane' testen - Toevoegen Bij verdenking/besmetting zoeken naar alternatieve invulling ondersteuning, - Medische maskers ook voor individuele opvang en maatschappelijke opvang, risico op besmetting is gelijk.
	-	

4. Meelezen Verenso update behandeladvies

5. Herverdeling taken leden TF;

- a. Mailbox beheer
- b. Agenda, notulen, vergaderruimte, voorzitten
- c. Vragen beantwoorden
- d. Wrap up
- e. Meelezen/ document herschrijven