Patiënt voldoet aan criteria voor diagnostiek?

Extramuraal

- Patiënt belt of bezoekt de huisarts en voldoet mogelijk aan criteria voor bemonstering
- De huisarts **overlegt met de GGD** over de indicatie voor citodiagnostiek (indicatiestelling)
- De GGD overlegt met de LCI [redacted] 24-uursdienst) ter confirmatie van indicatie voor citodiagnostiek. Indien er indicatie wordt afgegeven, wordt ook besloten naar welk laboratorium de monsters gezonden worden (EMC/IDS). Zie Aanvullende informatie.

Bij indicatie voor citodiagnostiek

- Indien er noodzaak tot opname is, overlegt de GGD/huisarts met een internist(-infectioloog)/arts-microbioloog over verplaatsing per ambulance met strikte isolatie conform ambulancerichtlijn. Zie verder Procedure intramuraal.
- De GGD neemt contact op met het coördinerend laboratorium:
  - ofwel de dienstdoende viroloog van de unit Klinische Virologie afdeling Viroscience van het Erasmus MC [redacted]; buiten kantooruren: [redacted])
  - ofwel de dienstdoende viroloog van RIVM-IDS: [redacted] (ook buiten kantooruren)
- De GGD draagt zorg voor afname van materiaal (zie Aanvullende informatie). Een zo diep mogelijk respiratoir materiaal heeft de voorkeur, minimaal keelwat in virustransportmedium, eventueel ook nasopharynsswab. Bij afname dient druppel- en contactisolatie in acht genomen te worden (zie Aanvullende informatie). Gebruik hiervoor een FFP2 masker, schort met lange mouwen, handschoenen en veiligheidsbril.
- Stuurt de GGD de monsters in zoals besproken met de bovenstaande viroloog naar het coördinerend laboratorium alwaar het materiaal gesplitst en doorgestuurd wordt zodat citodiagnostiek simultaan kan plaatsvinden.
- In afwachting van de uitslag wordt de patiënt thuis geïsoleerd. Voorlopig kan voor isolatiemaatregelen overlegd worden met de LCI, aanvullende handleiding volgt.

Coördinerend laboratorium:
Moleculair laboratorium test (PCR)

Parallel laboratorium:
Moleculair laboratorium test (PCR)

Onderling overleg over uitslagen leidt tot definitieve uitslag.

Bevestigde casus

Positieve uitslag

Laboratoriumtesten negatief

Doorgeven van de uitslag

- Coördinerend laboratorium informeert LCI en GGD over uitslag.
- GGD informeert behandelend (huis)arts en patiënt

Bevestigde casus

LCI en GGD overleggen over verder beleid, inclusief contactopsporing en bemonstering van contacten.