

Beleid PBM voor de Wmo ondersteuning

Wmo ondersteuning

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | Versie .. mei 2020 (versiebeheer zie onderaan deze pagina)

Wmo ondersteuning behelst bijvoorbeeld:

- huishoudelijke hulp
- begeleiding en dagbesteding
- maaltjondondersteuning

Hygiëne

Voor deze medewerkers Wmo ondersteuning geldt dat zij zich dienen te houden aan de algemene hygiënemaatregelen conform de [‘veilige vijf’- adviezen bestemd voor de thuiszorg](#).

Dat betekent in ieder geval:

- Houd je aan de algemene hygiëne voorschriften zoals:
 - toepassen handhygiëne;
 - geen handen geven;
 - hoesten en niezen in de elleboog;
 - papieren zakdoekjes gebruiken.
- Houd 1,5 meter afstand.

Gebruik van PBM

- Het is van groot belang om bij het begin van de hulp bij mensen thuis, elke keer weer, zelf klachtenvrij te zijn en te informeren naar de gezondheid van de cliënt ('triage').
- Client is besmet of mogelijk besmet met COVID 19 dan geldt het volgende:
 - Indien is vastgesteld dat de cliënt besmet is met COVID 19 dient de medewerker niet bij de cliënt naar binnen te gaan. In dat geval wordt de ondersteuning uitgesteld.
 - Indien er een vermoeden bestaat dat de cliënt besmet is met COVID 19, is het belangrijk dat de cliënt zich laat testen. Totdat de testuitslag bekend is, wordt de ondersteuning uitgesteld.
- Indien de cliënt niet besmet is met COVID 19 kunnen de ondersteunende taken worden volbracht buiten de 1,5 meter en zijn PBM niet nodig.
- Er zijn echter specifieke situaties waarin uitstel niet mogelijk is en ook situaties waarin een medewerker – bij voorkeur in overleg met collega's en/of leidinggevenden - bereideneerd afwijkt van de algemene uitgangspunten. Voor die gevallen is het verstandig dat de medewerker een "reservepakketje" aan medische beschermingsmiddelen bij zich heeft. Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen.

Maatregelen bij een medewerker met klachten**Hoesten/niezen**

Een hoestende/niezende medewerker verdacht voor COVID-19 kan getest worden en blijft totdat de uitslag bekend is bij thuis.

Koorts

Medewerkers met koorts blijven thuis en kunnen getest worden. (Zie ook [Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers.](#))