

Samenvatting beleid tav preventief gebruik van pbm in verpleeghuizen (7-10-2020)

- Verwezen wordt naar het behandeladvies van Verenso dat is aangepast op 6 oktober. Dit adviseert om in regio's waar de situatie als ernstig is omschreven, maar ook voor regio's waar de situatie 'zorgelijk' is, aan om "over te gaan tot preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (minimaal type II)¹¹ door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter. Besluit door het bestuur op advies van het uitbraak/crisisteam. Een uitzondering kan worden gemaakt bij patiënten(groepen) met een laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden (bijvoorbeeld jongeren)." Samengevat: "gebruiken (tenzij)". Dat "tenzij" is een professionele, eigenstandige afweging. Een voorbeeld is dat je te maken hebt met een cliënt die vanwege bijvoorbeeld dementie zou schrikken van een behandelaar, en dat de behandelaar inschat dat het niet nodig is.
- Eerder (1 oktober) heeft V&VN geadviseerd om altijd (preventief) mondmaskers te gebruiken, tenzij zorgverleners zelf op basis van hun eigen professionele afweging besluiten daarvan af te wijken.
- In regio's waar de situatie als waakzaam is omschreven kunnen zorgverleners zoals al eerder (vanaf 1 mei) is aangegeven op basis van hun professionele oordeel afwijken van de algemene uitgangspunten voor gebruik van pbm. Dus ook al is het niet expliciet aan de orde vanwege het feit dat de situatie ernstig of zorgelijk is, dan nog kan elke professional die afweging maken.
- De sector schat op dit moment in dat in de praktijk zo'n 70-75% van de huizen op dit moment preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kent.
- Bij de afweging is ook de kwaliteit van de zorgverlening van belang, waarbij meegewogen moet worden of het gebruik van mondmaskers altijd bevorderlijk is voor goede zorgverlening.

Tijdslijn:

5.1.2I OMT

- Op **8 september** heeft Verenso dit uitgewerkt in het behandeladvies
-
- In het behandeladvies is aangegeven: "In geval van verhoogde (regionale/lokale) prevalentie: ga in ieder geval bij het bereiken van de vastgestelde drempelwaarde over tot het preventief gebruik van chirurgische mondneusmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter. Besluit door het bestuur op advies van het uitbraak/crisisteam. Een uitzondering kan worden gemaakt bij patiënten(groepen) met een laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden (bijvoorbeeld jongeren)."
- Op **28 september** heeft het OMT aanvullende maatregelen in verpleeghuizen geadviseerd waaronder preventief mondneusmaskergebruik.
-
- Onder het kopje aanvullende landelijke maatregelen: "Aanvullende maatregelen in verpleeghuizen: preventief mondneusmaskergebruik"
- Het kabinet heeft in de brief van **28 september** dit beleid voor preventief gebruik van mondneusmaskers in de drie regio's met het predicaat 'ernstig' expliciet benoemd, en heeft daarbij verwezen naar het behandeladvies van Verenso.

- Op **29 september** heeft Verenso, in aanvulling op deze passage in de brief van het kabinet, een toelichting gegeven op hun behandeladvies op haar website. Hierin wordt geadviseerd om preventieve inzet pbm ook te overwegen als een gebied als zorgelijk wordt aangemerkt. Het behandeladvies van Verenso biedt hier al ruimte voor.

“De minister geeft aan dat wanneer een gebied “ernstig” is, er gebruik moet worden gemaakt van mondmaskers. Als Verenso zouden we willen adviseren de inzet van preventieve mondmaskers ook al eerder te overwegen bij een verhoogde prevalentie. Ook bij een gebied dat als “zorgelijk” wordt gedefinieerd, kun je preventief PBM inzetten, zoals al in veel huizen al geruime tijd gebeurt. Hierbij geldt dat er altijd gekeken moet worden naar de lokale situatie en de doelgroep voor wie je zorgt.”

- Op 6 oktober heeft Verenso het behandeladvies aangepast en opgenomen:

5.4.3 Situatie van verhoogde (regionale/lokale) prevalentie

- In geval van verhoogde (regionale/lokale) prevalentie, te weten in ieder geval een regionale/lokale prevalentiewaarde die overeenkomt met het predicaat ‘zorgelijk’ (zie uitleg over de risiconiveaus in het coronadashboard)⁹:
 - Verpleeghuissector en voor de VG-sector aan verpleeghuispopulatie gelijkwaardige doelgroepen¹⁰: ga over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (minimaal type II)¹¹ door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter. Besluit door het bestuur op advies van het uitbraak/crisisteam. Een uitzondering kan worden gemaakt bij patiënten(groepen) met een laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden (bijvoorbeeld jongeren).
 - Voer een strikter opname/overplaatsingsbeleid: bij de toekenning van het risicoprofiel is de verhoogde regionale/lokale prevalentie leidend en behoort elke patiënt tot het hoge risicoprofiel, dit betekent 10 dagen quarantaine (zie document Medisch opname/overplaatsingsbeleid).
 - Pre-emptive testen van patiënten en medewerkers: er is op dit moment onvoldoende onderbouwing om preventief periodiek testen van medewerkers en/of bewoners van verpleeghuizen te adviseren.

5.1.2i OMT

5.1.2i OMT