

Advies BAO 9 november

Aanwezig:

5.1.2e, 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (Veiligheidsregio's), 5.1.2e, 5.1.2e e
 5.1.2e (GGD), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e (VNG)
 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e (OCW), 5.1.2e (SZW), 5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e (NCTV)
 5.1.2e (vz), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e (allen VWS)

OMT advies

Epidemiologische situatie 6 november

Sinds het laatste OMT van maandag 2 november tonen de aantallen meldingen, ziekenhuis- en IC-opnames een voorzichtig dalende trend. Het reproductiegetal (Rt) daalt langzaam, retrospectief is de Rt voor het eerst op 19 oktober onder de 1 gekomen. De eerdere prognose voor de Rt is valide, maar de afname van de Rt gaat aanzienlijk trager dan in maart. Dus de verspreiding van COVID-19 neemt voorzichtig af, maar de infectiedruk blijft nog hoog en neemt langzaam af.

Extra maatregelen

De noodzaak op korte termijn extra maatregelen te nemen is voor dit moment weggenomen. Het OMT zal een advies opstellen hoe gekomen kan worden tot een goed onderbouwde selectie van veiligheidsregio's die een minder gunstige trend tonen dan de rest van het land. Verder zal het OMT de situatie de komende dagen nauwgezet volgen en niet schuwen hier eventueel ook ongevraagd een advies over uit te brengen.

Prognoses

Zowel de prognoses van IC- als van ziekenhuisopnames tonen dat de maatregelen van 13 oktober een effect hebben. Een mindere mate van effect dan eerder verwacht en aangenomen is echter nog niet met zekerheid uit te sluiten; het verdere beloop van de epidemiologie zal dit duidelijk maken. Het moment dat Nederland weer op de signaalwaarden voor IC- en ziekenhuisopnames zit is naar verwachting begin januari.

Quarantaineperiode en testbeleid, incl. reizigers

De compliance met quarantaine in Nederland is zeker niet optimaal.

Op dit moment is alleen de PCR gevalideerd voor testen van asymptomatische personen. De PCR-testcapaciteit heeft de afgelopen tijd onder druk gestaan, maar er lijkt nu ruimte te komen om deze ook voor asymptomatische personen in te zetten. Mede gezien de huidige testcapaciteit acht het OMT het verantwoord om een PCR-test aan te bieden op de vijfde dag na het laatst mogelijke blootstellingmoment, of later al naar gelang iemand later als nauw contact is getraceerd. Een negatief geteste persoon op dag 5 na het laatst mogelijke blootstellingmoment aan de index kan dan uit quarantaine, mits deze persoon alert blijft op het ontstaan van klachten en zich als zich dat voordoet subiet opnieuw laat testen; dit geldt voor de periode tot 14 dagen na dat laatste blootstellingmoment.

Voor personen die contact hebben met kwetsbare personen met een verhoogd risico op complicaties geldt dat zij deze contacten gedurende de gehele tien dagen vermijden, onafhankelijk van een negatieve PCR-testuitslag. Voor personen die werkzaam zijn in de zorg geldt, dat zij na een negatieve PCR-testuitslag van persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik dienen te maken, tot ten minste tien dagen na het laatste

mogelijke contact. Voor deze twee categorieën van personen zal het OMT in een vervolgadvisie een verdere uitwerking geven. Bij zorgmedewerkers met klachten een indicatie voor een PCR-test om COVID-19 uit te sluiten; in deze context is een negatieve antigeensneltest niet toereikend

Bovenbeschreven beleid kan in alle GGD-regio's waar de test- en BCO-capaciteit op orde is, worden voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast is het raadzaam in enkele GGD-regio's de performance van (antigeen)sneltesten bij personen zonder klachten in vergelijking met de PCR te onderzoeken om tot een validatie-advisie te komen m.b.t. het gebruik van deze sneltesten als alternatief voor de PCR voor het testen van asymptomatische personen tijdens de quarantaineperiode.

Het OMT adviseert om de mogelijkheid voor het vereisen van een negatieve testuitslag bij binnenkomst in Nederland voor alle reizigers (zowel van terugkerende Nederlanders als buitenlandse bezoekers aan Nederland) uit oranje of rode gebieden, te verkennen of dit mogelijk is omdat dit onze voorkeur heeft.

Resultaten PIENTER-3-onderzoek

Het OMT heeft kennis genomen van de resultaten van de PIENTER Coronastudies, de seroprevalentie is gestegen van 2,8% in april, naar 4,5% in juni en verder naar 5,1% begin oktober.

Uitzondering voor kinderen m.b.t. zingen in groepsverband

In het vorige OMT-advisie van 2 november jl. is geadviseerd zingen in groepsverband in welke context dan ook af te raden. Hieronder viel ook zingen op scholen en kindercentra. Achteraf komt het OMT op dit advies terug voor wat betreft zingen door jonge kinderen. Omdat kinderen zelf weinig ziek worden van COVID-19 en weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus, is het OMT van mening dat voor kinderen t/m 12 jaar een uitzondering gemaakt kan worden.

BAO-advisie