

Monsterafnames

IDS

- 1 stolbuis + 2 CPT buizen
- Neus/keelmonster
- IIV:

Voor immunologisch onderzoek zouden we graag zoals **5.1.2e** al aangaf volgende willen afnemen:

- 1 stolbuis (serum) van 8 ml voor serologische analyses
- 3x8ml heparine buis voor PBMC isolatie voor cellulaire immuniteit (we hebben slechte ervaring met CPT buizen vandaar toch weer terug naar EDTA buizen en ficollen)
- Indien mogelijk 1 paxgene buis van 1 ml voor RNA isolatie.
- In totaal is dit 33 ml.
- Voor kinderen <4 jaar is dit veel, in andere studies beperken we ons tot 1 ml bloed voor serum en 2x4 ml voor PBMCs.
- Plus een speekselmonster (alleen op t=1?) Wat als contact case wordt, dan nogmaals?
-
-
-
- Neus/keelmonsters iedere 2/3 dagen voor contacten niet optioneel? Voor cases wel?
- Plus nog bloedafname op 6 weken, alleen bij cases?
- Zelftest voor nu achterwege laten?
- Toch wat verschillen tussen Osiris en basisvragenlijst? Cases ook nogmaals zelf de basisvragenlijst laten invullen? Voor iedereen hetzelfde.
- Digitaal via formdesk
- Indien iemand niet mee doet aan optionele neus/keelmonster, wel testen op moment dat contact klachten krijgt?
-
-
- Alleen korte termijn!
- Wat is echt nu nodig!
- Waar is die 6 weken voor nodig?
- Puur gericht op bestrijding.
-
- Gepaarde sera -> op z'n minst van een persoon op twee momenten.
-
-
- Functioneel emailadres + plus telefoon regelen.
-
- Contacten worden niet meer routinematige getest.
-
- Controles samplen?
-
- Klachtendagboekje voor case iedere dag, voor contact om de 2/3 dagen.
-
-