To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 1.2 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e @vggm.nl)[5.1.2e @vggm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl'[5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @erasmusmc.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 1/18/2021 9:52:42 AM
Subject: RE: CONCEPT (lab)inf@ct 87
Received: Mon 1/18/2021 9:52:43 AM

Hoi
Hierbij mijn commentaar- heb vooral naar handreiking testen gekeken.
Er wordt wel erg veel doorverwezen en binnen de verwijzing raak je de weg kwijt: er wordt eerst verwezen naar omt 83 en 84 en daarna pas naar 94. Ik zou de korte samenvatting opnemen zodat de ontvangers niet eindeloos informatie op moeten zoeken. Het gaat maar om een paar zinnen die denk ik het samenvatten. Over de PCR is denk ik voldoende kennis onderhand; de anderen mogelijk nog niet.

Antigeensneltesten hebben een lagere sensitiviteit dan een PCR, de specificiteit is goed. Dit betekent dat er weinig tot geen fout-positieve testuitslagen zijn, maar wel een grotere kans op fout-negatieve uitslagen. Antigeensneltesten laten snel en veelvuldig testen toe met een mogelijk hogere testbereidheid als gevolg.

Andere technieken gebaseerd op nucleïnezuur amplificatie (NAAT) naast PCR, die voor COVID-diagnostiek gebruikt worden, zijn de loop-mediated isothermal amplification (LAMP) en de transcription mediated amplification (TMA). Deze worden als equivalent beschouwd. De LAMP geeft sneller een resultaat dan de meeste PCR-testen.
De ademtest is een vóórscreeningstest. Bij een positieve uitslag dient **altijd** een tweede test ingezet te worden (PCR, LAMP of TMA of antigeensneltest), maar een negatieve test sluit infectie bij symptomatische personen en bij personen met bekende blootstelling betrouwbaar uit.

(bron diagnostiekparagraaf richtlijn)

Groet
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel