







Comirnaty			
	-90 tot -60 °C	2-8 °C	8 - 30 °C
 Vaccinflacon onaangeboren	6 maanden	Tot de "te gebruiken datum en tijd" (staat vermeld op de tray). (maximaal 120 uur na verwijdering uit de vriezer)	2 uur (na verwijdering uit de koelkast)
Opgelost vaccin in vaccinflacon	N.v.t.	6 uur na moment toevoegen oplosvloeistof	
Vaccin opgetrokken in spuit	N.v.t.	Zo spoedig mogelijk (Uiterlijk binnen 6 uur)	
Transport			
Altijd goed inpakken (rechttop) en beschermen tegen overmatig schudden*			
Auto, fiets of lopend   Alleen toegestaan voor <u>onaangeboren</u> vaccinflacons	N.v.t.	3 uur	N.v.t.
Lopend binnen een locatie  Opgelost vaccin in vaccinflacon (ook na onttrekking 1 of meerdere doses) (vervoeren zonder optreknaald)	N.v.t.	6 uur na moment toevoegen oplosvloeistof	

<p>Lopend binnen een locatie</p>   Vaccin opgetrokken in spuit	N.v.t.	Zo kort mogelijk (uiterlijk binnen 6 uur)
--	--------	--

* instructies "goed vaccinbeheer" in acht nemen (zie bijlage XX)

Nb1. Uit de koelkast gehaald vaccin mag alleen terug geplaatst worden in de koelkast als op de flacon te herleiden is hoe lang het nog te gebruiken is bij kamertemperatuur of wanneer de zes uur na toevoegen van de oplosvloeistof verstreken zijn.