

Testen

- Testen van gevaccineerde bij klachten passend bij COVID-19: bij klachten testen, niet veranderen totdat er meer gegevens zijn over .
- Bij klachten (malaise, koorts, verhoging, diaree) vlak na de vaccinatie: als klachten ontstaan binnen 24 uur na vaccinatie, dan betreft het waarschijnlijk een bijwerking van de vaccinatie, en is de verwachting dat de klachten spontaan zullen verbeteren. Als dat niet zo is, en/ of er zijn ook luchtwegklachten, en/of er is contact geweest met een besmettelijke patient, dan wordt er iom de GGD wel getest.

➤NB: in OSIRIS vraag over vaccinatiestatus opnemen.

Suggestie 5.1.2e

"als een persoon in de 24 uur na vaccinatie koorts ontwikkelt zonder overige klachten passend bij COVID-19 zoals luchtwegklachten, darmklachten of spierpijn, dan kan alleen met paracetamol worden afgewacht gedurende 24 uur. Indien de koorts na 24 uur niet verdwenen is, moet de persoon zich laten testen en moeten huisgenoten in quarantaine totdat de testuitslag heeft uitgewezen dat er geen sprake is van COVID-19."

BCO:

Iemand die 2 vaccinaties heeft ontvangen