

## Course of action | Antigeen als secundaire test voor fase 2 in Spoor 2a

### What?

*In fase 2 van Spoor 2a is een maximale capaciteit van 175.000 testen benodigd voor evenementen met een hoog risicoprofiel. De Stuurgroep Sneltesten en het LCT stellen vast dat er geen splitsing mogelijk en nodig is tussen de hoog en laag risico evenementen en een daarbij aansluitende toewijzing van een specifiek type test. Deze toewijzing was wel aangenomen in spoor 2a bij de start van de opschaling.*

*De aangewezen primaire test voor Spoor 2a is de SpiroNose. Op basis van recente resultaten is de verwachting dat ca. 40% van de afgenomen ademtesten een onbepaald testresultaat (i.e. niet-negatief) geeft. Deze personen dienen derhalve opnieuw te worden getest met een secundaire test. Van de secundaire test ligt momenteel alleen vast dat de LAMP zal worden gebruikt. De maximale capaciteit van deze test bedraagt ca. 20.000 testen per dag.*

### So what?

*De maximaal beschikbare capaciteit van LAMP is niet toereikend is voor een volledige dekking van het beoogd aantal secundaire testen in Spoor 2a. Er is behoefte aan een aanvullende secundaire test.*

*Gezien het moment wanneer de test moet worden ingezet (1 juli 2021) en de voorwaarde van een snel resultaat per test, zijn de belangrijkste criteria voor de secundaire test de beschikbaarheid en de doorlooptijd. De antigeen sneltest voldoet het beste aan deze criteria. Alternatief voor de inzet van antigeen sneltesten is de inzet van een PCR test. Deze hebben echter hogere doorlooptijden of zijn niet tijdig beschikbaar en gevalideerd.*

*Er dient een formeel akkoord te worden gegeven voor de mogelijkheid tot inzet van de antigeen sneltest in Spoor 2a als secundaire test, alvorens deze test kan worden geselecteerd en gebruikt.*

### Now what?

*Is het LCT akkoord met het volgende voorstel?*

- 1. Inzetten van antigeen sneltest als secundaire test voor fase 2 in Spoor 2a. Dit advies is gebaseerd op de beschikbare voorraad van antigeen sneltesten, waardoor de test tijdig beschikbaar is, en de korte doorlooptijd per test. Daarnaast zorgt de inzet van antigeentesten voor een doelmatige inzet van reeds ingekochte testen.*
- 2. Inzetten van de antigeen sneltest als fall-back in geval van uitval of tekorten van ademtest en/of LAMP in spoor 2a*