

Uitwerking testen tijdens quarantaineperiode- concept versie 16-11-2020

Achtergrond

Doelgroepen:

De volgende mensen komen in aanmerking voor het testen tijdens de quarantaineperiode

- Huisgenoten van een bevestigde Covid-19 patiënt
- Overige **nauwe** contacten van een bevestigde Covid-19 patiënt
- Personen die via de app CoronaMelder een waarschuwing hebben gekregen.

Tijdstip van testen van contacten:

Een test in de quarantaineperiode zal aan deze groepen worden aangeboden 5 dagen na het laatste contact met de COVID-19 patiënt. Dit tijdstip is belangrijk, omdat bij een vroegere test het virus nog niet aantoonbaar kan zijn in de neus- en keelholte. De PCR is het meest gevoelig en kan twee tot drie dagen voor de eerste ziektedag het virus aantonen. De uitslag is dan 24-48 uur later bekend en indien deze negatief is, mag het contact uit quarantaine.

Als iemand later in beeld komt als contact, kan de test na de 5^e dag worden afgenomen (tot uiterlijk op dag 10)

Het is wel van belang dat deze persoon alert blijft op het ontstaan van klachten en zich als zich dat voordoet subiet opnieuw laat testen; dit geldt voor de periode tot 14 dagen na dat laatste blootstellingsmoment.

Belangrijke adviezen na een negatieve testuitslag in de quarantaineperiode:

Naast het alert zijn op symptomen tot 14 dagen na het laatste blootstellingsmoment én hertesten bij ontstaan van klachten voor alle cat 1+2 contacten, geldt voor de volgende groepen nog een extra advies:

- Voor personen die contact hebben met kwetsbare personen met een verhoogd risico op complicaties geldt, dat zij deze contacten gedurende de gehele tien dagen vermijden, onafhankelijk van een negatieve PCR-testuitslag.
- Voor personen die werkzaam zijn in de zorg geldt, dat zij na een negatieve PCR-testuitslag niet werken, tenzij zij niet gemist kunnen worden. Dan is het van belang dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik dienen te maken, tot ten minste tien dagen na het laatste mogelijke contact.

5.1.2e

5.1.2f OMT

Implicaties voor het bron- en contactonderzoek:

Voorwaarden aan het doorvoeren van testen in de quarantaineperiode:

- de lokale GGD voert volledig BCO uit, met name wat betreft onderstaande punten:

- alle cat 1+2 contacten door de GGD gebeld en geregistreerd (in HPzone), zodat tijdens dit gesprek ook direct een test kan worden afgesproken en zo mogelijk ingepland;
- voor huisgenoten (cat 1) moet het duidelijk zijn wanneer hun quarantaine ingaat, hiervoor is het van belang dat de GGD contact heeft met index en huisgenoten, zodat de testdatum van huisgenoten kan worden bepaald;
- bij voorkeur vindt er ook een monitoringsgesprek van cat 1+2 contacten op dag 10 plaats, zodat er zicht is op het eventueel toch nog ontwikkelen van klachten.

Op het moment dat een GGD niet aan deze voorwaarden voldoet en risicogestuurd BCO (type 2,3,4) uitvoert, dan kan een test op dag 5 wel worden aangeboden, maar plant het contact deze test zelf in en is het veel moeilijker om clusters in kaart te brengen en om goede BCO data te verkrijgen.

Welke onderdelen van het BCO veranderen allemaal:

- stap 1 informeren van de index
- stap 2b informeren van de huisgenoten
- stap 2c informeren van de nauwe contacten
- stap 4,5,6 monitoring van index, huisgenoten en nauwe contacten

Operationalisatie:

wat moet er allemaal worden aangepast wanneer dit wordt doorgevoerd?

- Publiek(s)website: (5.1.2e zijn aangehaakt)
 - quarantaineduur moet worden aangepast/aangevuld met uitleg over de voorwaarden en implicaties van testen in de quarantaineperiode
 - informatie op RO aangepast (meelezen door LCI)
 - quarantaine gids?
 - Q en A RIVM website
- LCI richtlijn COVID:
 - Bijlagen mbt quarantaine
- BCO protocol:
 - Beleid bij huisgenoten
 - Beleid bij overige nauwe contacten
 - Evt beleid bij asymptomatische infecties: wanneer wordt beleid voor deze groep aangepast (5.1.2e 5.1.2e)
 - Informatiebrieven
 - aan huisgenoten en
 - aan nauwe contacten
 - waarschijnlijk ook aan de index
 - in alle talen en ook eenvoudige versie
- uitwerking mbt werkwijze BCO in praktische werkinstructie (zie hieronder)
- App: melding aanpassen die mensen krijgen (5.1.2e 5.1.2e , VWS)

Uitvoering GGD: BCO, testen:

- BCO werkinstructie (evt met werkgroepje samen met GGD GHOR klaarmaken voor gebruik door GGD'en en landelijke BCO capaciteit (zodat deze 'klaarligt' voor gebruik))

- Ter goedkeuring voorleggen op eerstkomende COVID-LOI (wanneer is dat)?
- Uniform gaan gebruiken door GGDen en GGD GHOR partijen
- Testen: bescrypt GGD NL, website (DigiD): testen van personen in quarantainetijd zonder klachten: PCR, test bij voorkeur vooraf in te plannen (nu tot 48 uur vooruit, kan dit langer?)

Nog verder uit te werken:

- Hoe zit het met asymptomatische indexen, geldt dit ook voor hun contacten?
- Wat als een contact niet getest wil worden (dan 10 dagen quarantaine, dit moet er ook nog in)
- Wat als een contact niet verschijnt op testen (dan mis je dat volledig, monitoring maakt dit wel zichtbaar maar lost dit niet op).
- Evt aanpassingen **testprotocol** voor validatie antigeentesten 5.1.2e
 - o Welke GGD'en willen/kunnen gaan meewerken met validatie van antigeentesten?
En zijn zij er ook op voorbereid dat in het testprotocol monitoring op dag 10 plaatsvindt, iets wat nu door de meeste GGD'en nog niet gebeurt?
- Communicatie uitwerken (oa zorgmedewerkers: quarantaine niet opheffen tijdens het werk)

Actiepunten

Onderwerp	Datum	Besproken	Verantw.	Realisatie	stavaza
Onderzoek/validatie sneltesten	12/11	5.1.2e 5.1.2e : hoe het staat met het onderzoek conceptprotocol voor de validatie van de antigeensneltest voor het verkorten van de quarantaine duur	5.1.2e	16-11	5.1.2e heeft op 18-11 overleg met VWS hierover, men wil sneltesten inzetten (5.1.2e betrokken).
		Vinger aan de pols bij 5.1.2e	5.1.2e	doorlopend	
Document uitwerking testen tijdens quarantaineperiode	12/11	Afronden uitwerking testen tijdens quarantaine periode: - Voor de twee categorieën: personen die contact hebben met kwetsbare personen en voor personen die werkzaam zijn in de zorg het vervolgdadvies van het OMT uitgewerkt door 5.1.2e toevoegen.	5.1.2e		
	12/11	Uitwerking testen tijdens quarantaineperiode- in BCO-protocol voorleggen aan COVID-LOI	5.1.2e		
Publiek(website)/communicatie:	12/11	Informatie op Rijks Overheid aanpassen → meelezen door LCI	5.1.2e		
	12/11	Quarantaine gids	5.1.2e		
	12/11	Q&A RIVM website	5.1.2e		
	12/11	Vertalingen brieven	5.1.2e		
LCI richtlijn COVID	12/11	LCI richtlijn COVID Bijlages m.b.t. quarantaine aanpassen: Testbeleid en inzet zorgmedewerkers Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen Handreiking contactonderzoek in instellingen voor langdurige zorg Webredactie vragen verder de website te screenen welke documenten/richtlijnen nog moet worden aangepast	5.1.2e		Zie o.a. doc. Aanpassen nav quarantaineperiode van 14 dgn naar 10
BCO protocol	12/11	Beleid bij huisgenoten aanpassen Beleid bij overige nauwe contacten Evt. beleid bij asymptomatische infecties, testen op dag 3 (afhankelijk van wanneer beleid voor deze groep aangepast, nagaan bij 5.1.2e 5.1.2e)	5.1.2e	/ 19/11	NN: Afgesproken met 5.1.2e: asymptomaten maken in ieder geval 10 dagen Q af

		Quarantaineduur moet worden aangepast/aangevuld met uitleg over de voorwaarden en implicaties van testen in de quarantaineperiode			
	12/11	Q&A Viadesk voor GGD'en	5.1.2e		
Informatiebriefen	12/11	Aanpassen: - Index - Huisgenoten - Nauwe contacten - A2 versie - (vertalingen) etc.	5.1.2e		
GGD GHOR NL		BCO werkinstructie van GGD GHOR NL voor GGD'en en landelijke BCO → gebruiksklaar maken.	5.1.2e		
Coronamelder App		Overleg met 5.1.2e over app dat protocol etc. synchroon loopt met de app	5.1.2e	17-11 19-11	
		Vinger aan de pols bij 5.1.2e	5.1.2e		
HP-zone	12/11	5.1.2e betrekken	5.1.2e		
		5.1.2e 5.1.2e spreken	5.1.2e	18-11	