To: [redacted] [redacted]@lcdk.nl]
Cc: [redacted] [redacted]@igh.com]; [redacted] [redacted]@igh.com]; [redacted] ([redacted])[redacted]@minvws.nl]; [redacted] [redacted]@minvws.nl]; [redacted] [redacted]@minvws.nl]; [redacted] [redacted] [redacted]@ggdghor.nl]; [redacted] [redacted]@rivm.nl] [redacted] [redacted]@ggdghor.nl]; [redacted]@gmail.com[redacted]@gmail.com]; [redacted] [redacted] Sightline[redacted]@sightline.nl]; kg.smit[redacted]@minvws.nl]; [redacted] [redacted]@rivm.nl]; [redacted] [redacted]@minvws.nl]; [redacted] [redacted] [redacted]@lcdk.nl]; [redacted] [redacted]@lcdk.nl]; [redacted] [redacted]@operatiefastlane.nl]; [redacted] [redacted]@rivm.nl]; [redacted] [redacted]@lcdk.nl]
From: [redacted]
Sent: Mon 6/7/2021 3:28:59 PM
Subject: Re: Alternatieven Spoor 2a - 2e fase secundaire test
Received: Mon 6/7/2021 3:29:18 PM

Beste [redacted]

de PCR test is verplicht voor medische diagnostiek en zorgmedewerkers ivm de hoge gevoeligheid. Verder wordt er door het OMT geen onderscheid gemaakt tussen de beschikbare testen bij de verschillende indicaties voor diagnostiek. Hier vind je een uitgebreide tabel: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen/verschillende-type-testen

Zowel TNO-LAMP als een aantal antigeentesten komen dus in aanmerking voor het testen in spoor 2a en daarbij is er geen onderscheid tussen deze twee technieken.

Ik zou willen aanraden de term hoog-sensitief in deze context niet meer te gebruiken. Het geeft alleen maar verwarring.

Mocht ik iets over het hoofd zien wat de term hoog-sensitief wel rechtvaardigt dan mis ik deze informatie en zou ik graag de achterliggende documenten eens zien.

MVG

[redacted]

[redacted]

dubbel

Pagina's zijn verwijderd 1474104

2 - 4

dubbel