

## Indicaties voor diagnostiek

### Testbeleid patiënten en zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID-19

Het testbeleid is gericht op de optimale behandeling van patiënten met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19, een optimaal infectiepreventiebeleid in instellingen waar kwetsbare personen verblijven en op de continuïteit van zorg door optimale inzet van schaarse zorgmedewerkers. Zie ook bijlage [Testbeleid risicogroepen COVID-19](#).

#### Patiënten in het ziekenhuis

Diagnostiek bij patiënten vindt plaats bij patiënten met klachten en symptomen van COVID-19 op geleide van het beleid in het betreffende ziekenhuis. Doel is een optimale behandeling van de patiënt en het voorkomen van verspreiding van COVID-19 in het ziekenhuis.

#### Patiënten buiten het ziekenhuis

Buiten het ziekenhuis heeft het testen van patiënten met klachten en symptomen passend bij COVID-19 meerwaarde bij risicogroepen voor ernstig beloop, als zekerheid over de diagnose van belang is voor de behandeling of verpleging van de patiënt. Daarnaast heeft testen meerwaarde bij risicogroepen die door hun gedrag verdere verspreiding kunnen veroorzaken binnen een instelling. De risicogroepen zijn beschreven in de bijlage [Testbeleid risicogroepen](#).

In instellingen zoals verpleeghuizen en woonzorgcentra waar veel lichamelijk kwetsbare mensen bij elkaar wonen, wordt diagnostiek tevens ingezet om introductie vast te stellen. Dit is van belang voor het infectiepreventiebeleid in de instelling.

#### Zorgmedewerkers

Voor de uitgangspunten van het testbeleid bij zorgmedewerkers, zie [bijlage Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#). Deze algemene uitgangspunten zijn voor de verschillende sectoren vertaald naar een sectorspecifiek advies over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers. Buiten het ziekenhuis heeft het – indien mogelijk – de voorkeur om zorgmedewerkers laagdrempelig te testen bij klachten en symptomen van COVID-19.

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
Ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patiënten met (ernstige) acute luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis</li> </ul>	Ziekenhuismedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Thuisblijven</li> <li>Vervangend werk</li> <li>PBM-gebruik</li> <li>Testen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuele patiëntenzorg</li> <li>Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers</li> <li>Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
Buiten het ziekenhuis: Huisartsenzorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patiënten uit</li> </ul>	Huisartsen en	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuele</li> </ul>

<p><b>Thuiszorg</b> (voornamelijk lichamelijk kwetsbare patiënten)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de risicogroep*</li> <li>• Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts / thuiszorg / zorghotel / hospice)</li> </ul> <p>Conform uitwerking NHG</p> <p>Niet van toepassing.</p> <p>Indicatiestelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)</p>	<p>praktijkmedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul> <p>Thuiszorgmedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• patiëntenzorg</li> <li>• Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg / hospice</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<p><b>Verpleeghuis</b> (uitsluitend lichamelijk kwetsbare patiënten)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patiënten verdacht voor COVID-19</li> <li>• Patiënten uit de risicogroep*</li> </ul> <p>Conform richtlijn VERENSO</p>	<p>Verpleeghuismedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infectiepreventie: isolatie of cohortering</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<p><b>Gehandicapten zorg</b> (woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patiënten verdacht voor COVID-19</li> <li>• Patiënten uit de risicogroep*</li> </ul> <p>Conform richtlijn</p>	<p>Zorgmedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infectiepreventie: isolatie of cohortering</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>

<p><b>Intramurale GGZ</b> patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar mogelijk gedragsproblemen</p>	<p>VERENSO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patiënten uit de risicogroep*</li> </ul> <p>Conform richtlijn GGZ-NL</p>	<p>Medewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> </ul> <p>Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming lichamelijk kwetsbare personen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<p><b>Instellingen voor Jeugdzorg</b> mogelijk gedragsproblemen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patiënten uit de risicogroep*</li> </ul> <p>In overleg met GGD</p>	<p>Medewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infectiepreventie: isolatie of cohortering</li> </ul>
<p><b>GGD'en</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patiënten verdacht voor COVID-19 (indien nodig voor bestrijding)</li> <li>• Zorgmedewerkers met klachten</li> </ul>	<p>GGD-medewerkers met klachten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis</li> </ul>
<p><b>Ambulancezorg</b></p>	<p>Niet van toepassing.</p> <p>Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis</p>	<p>Medewerkers met klachten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<p><b>Verloskundigen en kraamzorg</b></p>	<p>Niet van toepassing.</p> <p>Indicatiestelling</p>	<p>Verloskundigen met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette</li> </ul>

	door huisarts of in ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• medewerker</li> </ul>
--	--------------------------------	--	--

\* Voor de risicogroepen, zie de bijlage [testbeleid risicogroepen](#).

\*\* Indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus.

### **Aanvullende informatie ten aanzien van diagnostiek**

Zie de bijlage [Aanvullende informatie diagnostiek](#).

NB De situatie verandert snel. Actuele zaken zullen door middel van (Lab)inf@ct berichten worden gecommuniceerd. Bij discrepanties is (Lab)inf@ct leidend boven deze diagnostiekparagraaf.

*Vaststellingsprocedure NVMM loopt.*