

## Bulletin week 15 DOTT en LCT

### Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen (DOTT)

- Het rapport met de bevindingen van de **Gateway Review** is vorige week opgeleverd. Deze week zal er door de 5.1.2e van het reviewteam een toelichting worden gegeven in de Regiegroep.
- Na vaststellen **verbeterplan fase 2** wordt het vergaderschema en samenstelling aangepast. Voorstel is om één keer per twee weken een Regiegroep twee uur te vergaderen, de voortgang op acties/fiches zal wel eens per week per mail gebeuren.
- Er wordt verbinding gelegd met lopende trajecten in de keten wat betreft **toekomst rondom pandemiebestrijding**.

### Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT)

- 5.1.2e is gestart als 5.1.2e bij GGD GHOR Nederland.
- Er zijn geen bijzonderheden te melden met betrekking tot de **Cockpit Testen en Traceren** de afgelopen week.
- Op korte termijn zal de **vraagprognose** worden herzien, zodat Dienst Testen en GGD GHOR Nederland daar rekening mee kunnen houden bij de inkoop en verdeling van testcapaciteit. Op de middellange termijn zal ook een structurele heroverweging van de vraagprognose worden voorgelegd aan het OMT waar ook zaken als het effect van (besmettelijkheid na) vaccinatie, doorgemaakte ziekte, zelftesten en dergelijke worden meegewogen.
- Contract met **Breathomix** is nog niet rond. Als het contract wordt gesloten wordt er een werkgroep implementatie ademtest opgericht met GGD, spoor 2 vertegenwoordigers en Breathomix.
- De eerste resultaten met betrekking tot **Grootschalig, Risicogericht Testen** lijken erop dat GRT in sommige situaties zinvol kan zijn, zij het dat het niet zo grootschalig hoeft te zijn als we een aantal maanden geleden dachten. Er wordt gekeken naar een tussenoptie, waarbij niet een heel dorp/stad, maar aantal straten of wijken wordt uitgenodigd voor een test. Bestuurlijk draagvlak in gemeente en capaciteit bij GGD zijn essentieel.
- **Bijsluiter** toegevoegd aan **zelftest** met verzoek te melden bij GGD en in quarantaine te gaan. Het OMT heeft een onverwacht advies gegeven. Na positieve zelftest zou direct BCO moeten worden opgestart. Eerder werd verwacht dat na een positieve zelftest een hertest zou moeten volgen en daarna - indien positief - BCO. GGD onderzoekt de uitvoeringsconsequenties van dit advies.