

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e
From: 5.1.2b
Sent: Sun 5/10/2020 9:22:20 AM
Subject: FW: SARS-CoV-2 in riool...en feces
Received: Sun 5/10/2020 9:22:21 AM

From: 5.1.2e
Sent: Sunday, 10 May 2020 11:22:20 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
To: 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2b
Subject: RE: SARS-CoV-2 in riool...en feces

Dag 5.1.2e,

Ff snel gekeken in bestand wat ik toch al gedownload had. In FFX pakweg een derde van positieve feces afkomstig van kinderen (leeftijd <18). Koppeling met klachten moeten we navragen bij epi. Zal ik doen.

Mvg

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: zondag 10 mei 2020 10:24
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2b <5.1.2b@rivm.nl>
Subject: SARS-CoV-2 in riool...en feces

hoi hoi

wij en anderen hebben gezien dat we meer /makkelijker SC2 in riool vinden dan wat we zouden verwachten op basis van de huidige gevonden prevalenties in feces: zit in de ffx data ook feces van bv symptoomvrije kinderen? of in een ander cohort wat we hebben?

zou het kunnen dat ouderen vn respiratoire klachten onwtikkelen en bv kinderen een intestinale infectie, zonder al te veel symptomen? zover ik kan zien wordt de feces van kinderen zelden ge-analyseerd.

vr gr

5.1.2e

From: 5.1.2e
Sent: Friday, May 01, 2020 7:50 AM
To: 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2b
Subject: Stuk uit belgie over gevoeligheid pcr voor sars2