

1

december

2020

(Lab)Inf@ct: COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (78)

In dit bericht:

- Testen in de quarantaineperiode: wijzigingen in het BCO-beleid.
- Beleid bij vliegtuig-, bus- en treincontacten en contacten in het buitenland toegevoegd aan protocol BCO.
- Versoepelen advies antigeensneltesten voor personen met milde klachten, behorende tot de medische risicogroep buiten instellingen.
- Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19.

Bericht:

Testen in de quarantaineperiode: wijzigingen in het BCO-beleid

Zoals eerder bericht (Inf@ct 76) heeft het OMT geadviseerd om huisgenoten en overige nauwe contacten van een patiënt met COVID-19 én mensen die een notificatie via de CoronaMelder-app hebben gekregen, tijdens de quarantaineperiode 5 dagen na de laatste blootstelling een PCR-test aan te bieden, ook als zij (nog) geen klachten hebben. Het doel van dit testbeleid is om presymptomatische infecties vroeg te detecteren en om de quarantaineperiode te verkorten bij een negatieve uitslag.

Voor huisgenoten (categorie 1) en overige nauwe contacten (categorie 2) blijft het standaardadvies om in quarantaine te gaan, en om zich bij klachten te laten testen. Als 5 dagen na de (laatste) blootstelling een PCR-test op SARS-CoV-2-infectie negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven. Wel wordt nadrukkelijk aan hen geadviseerd alert te blijven op klachten en om bij ontstaan van of verergering van klachten zich opnieuw te laten testen. Ook wordt contact met personen met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19 ontraden tot en met 10 dagen na de laatste blootstelling. Negatief geteste zorgmedewerkers overleggen met hun werkgever of zij mogen werken.

Tijdens het eerste gesprek met categorie-1- en 2-contacten wordt gevraagd een afspraak voor een PCR-test in te plannen op dag 5 na het laatste blootstellingsmoment. Voor huisgenoten (categorie 1) blijft een monitoringsgesprek op dag 5 en dag 10 gehandhaafd. Voor overige nauwe contacten (categorie 2) vervalt het monitoringsmoment op dag 5. Met hen vindt wel op dag 10 na de laatste blootstelling een afsluitend monitoringsgesprek plaats. HPZone wordt hier op aangepast.

Personen die een waarschuwing krijgen via de CoronaMelder-app, krijgen via de app advies over de quarantaine, wanneer zij zich kunnen laten testen en hoe zij een afspraak voor een PCR-test kunnen maken.

Voor reizigers komend uit hoogrisicogebieden (oranje en rood) wat betreft COVID-19 blijft het advies vooralsnog om 10 dagen in quarantaine te gaan, zij krijgen geen test aangeboden na 5 dagen om de quarantaineduur te bekorten.

Dit beleid gaat per 1 december in. De [richtlijn COVID-19](#) en het [protocol BCO](#) zijn aangepast op dit nieuwe beleid. Ook zijn de [informatiebrieven](#) voor huisgenoten en overige nauwe contacten aangepast. De vertalingen worden binnenkort aangepast. De bijlage 'Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis' wordt op zeer korte termijn aangepast.

Beleid bij vliegtuig-, bus- en treincontacten en contacten in het buitenland toegevoegd aan protocol BCO

Het beleid voor vliegtuig-, bus- en treincontacten, zoals eerder beschreven in de 'Handreiking BCO vliegtuigcontacten' en de 'Handreiking BCO internationale treinen en bussen' is opgenomen in het protocol BCO.

Genoemde documenten waren eerder al beschikbaar voor de GGD via Viadesk. De praktische uitwerking ervan wordt geplaatst op GGD Kennisnet (Training en toolkit BCO).

Versoepelen advies antigeensneltesten voor personen met milde klachten, behorende tot de medische risicogroep buiten instellingen

Personen met milde klachten uit de medische risicogroepen buiten zorginstellingen, die zich melden bij de GGD-teststraten kunnen met een antigeensneltest getest worden. Bij een negatieve testuitslag hoeven zij niet hertest te worden middels een PCR. Deze personen wordt gewezen op het belang dat zij zich bij verergering van klachten melden bij hun huisarts en zodra zij in zorg komen dienen zij, op basis van medisch-inhoudelijke afweging van de behandelaar, hertest te worden middels PCR.

Personen met ernstige klachten uit de medische risicogroepen die de huisarts of een andere behandelaar raadplegen en patiënten in zorginstellingen komen in aanmerking voor een PCR-test. Indien toch een antigeentest gebruikt wordt in deze groep dient, bij een negatieve antigeentest, deze middels een PCR bevestigd te worden.

Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19

In opdracht van het ministerie van VWS is, in samenspraak met meerdere partijen, [deze handreiking](#) opgesteld en opgenomen als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19.

De tekst is opgesteld om met name bedrijfsartsen en testfaciliteiten in het private spoor een handreiking te bieden, om hiermee richting te geven aan een juiste uitvoering van de SARS-CoV-2-testen.

Deze handreiking geldt als aanvulling op de 'Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 buiten de GGD-testlocaties' voor private/commerciële initiatieven en het [Arbo-inf@ct 'Inzet antigeentesten bij bedrijven/instellingen en de rol van de bedrijfsarts'](#).

Bij het opstellen van deze handreiking heeft vakinhoudelijke afstemming plaatsgevonden met het arboveld en middels een Arbo-inf@ct worden ook arboprofessionals over deze handreiking geïnformeerd.

Een van de paragrafen gaat specifiek in op 'Melden bij de GGD in het kader van de Wet publieke gezondheid'. De bedoeling is dat de testen uitgevoerd in dit spoor via een apart portaal via CoronIT worden geregistreerd en verwerkt, waarmee de automatische melding bij de GGD geborgd wordt. Hier wordt aan gewerkt. Vooralsnog dient de melding vanuit het private testspoor aan de GGD via beveiligde mail te verlopen. We verzoeken de GGD'en om dit te faciliteren.

Recent zijn de eerste resultaten van onderzoek naar testaanbieders [gepubliceerd op de IGJ-website](#).

Contactgegevens

- Overleg met uw regionale GGD over casuïstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.
- RIVM-LCI: tel. 030- 5.1.2e (ook buiten kantooruren bereikbaar)
- RIVM 5.1.2e (ook buiten kantooruren bereikbaar)
- Erasmus MC, 5.1.2e Unit Klinische Virologie afdeling Viroscience: tel. 010 5.1.2e (buiten kantooruren: 010 5.1.2e)

Meer informatie

- [ECDC](#)
- [WHO](#) en [Dagelijkse WHO situation reports](#)
- [RIVM \(algemene informatie\)](#)
- [LCI-richtlijn COVID-19](#)
- [Rijksoverheid](#)

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (RIVM-CIb), 5.1.2e (RAC/GGD
 Gelderland Midden), 5.1.2e (RAC/GGD Zuid Limburg), 5.1.2e (LOI/GGD
 Amsterdam), 5.1.2e (RIVM-CIb)