



Maatregelen en Meldingsplicht

OMT 146

10-02-2023



Voorstel test en isolatieadvies

- > (Zelf)test- en isolatieadviezen voor het algemeen publiek kunnen vervallen. Op indicatie van arts (bij klachten en zorgvraag) kan (PCR-)test worden afgenomen → testen terug naar reguliere zorg
 - *Verstrekken zelftesten onderwijs (en andere groepen, zoals sociale minima) niet meer nodig*
- > Testadviezen voor mensen met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19: maatwerk en valt onder de verantwoordelijkheid van behandelend arts
 - *verstrekken zelftesten medisch kwetsbaren niet meer nodig*
- > Zorgmedewerkers (in alle sectoren) werken met mondneusmasker bij luchtwegklachten.
 - *Discussiepunt OMT: Testadvies (antigeentest?) voor zorgmedewerkers met luchtwegklachten laten vervallen of handhaven? Indien handhaven: isolatie bij positieve test laten vervallen en vervangen door 10 dagen werken met een mondneusmasker of mondneusmasker zolang er luchtwegklachten zijn?*
- > Personen (anders dan zorgmedewerkers) die in contact komen met mensen met een verhoogde kans op een ernstig verloop van COVID-19: bij luchtwegklachten contacten vermijden of indien niet mogelijk (bijv. mantelzorgers) → mondneusmasker Geen testadvies
 - *verstrekken zelftesten medisch kwetsbaren (voor mantelzorger ?) niet meer nodig*



Testcapaciteit en opschaling

- > Teststraten worden inmiddels afgeschaald → aantal testen dat nu uitgevoerd wordt erg laag
- > Advies: testen terug naar de reguliere zorg voor zowel het algemeen publiek als mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop
- > Zorgmedewerkers nog faciliteren? Teststraat hiervoor nodig?
- > Opschaling van testcapaciteit in de vorm van GGD teststraten alleen bij variant die:
 - Een ernstig ziektebeeld geeft in de gehele populatie met hoge druk op de zorg
 - Zich snel verspreid
 - Niet wordt opgepikt door (antigeen)zelftesten
- > Kans op een dergelijk scenario (op korte termijn) klein, indien dit optreed waarschijnlijk landelijk aanvullende maatregelen nodig
- > Volledig afschalen teststraten → meer tijd nodig voor opbouwen van testcapaciteit



Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorstel PBM gebruik in zorginstellingen:

- › Aansluiten bij PBM adviezen in de bestaande protocollen voor luchtweginfecties
- › Oogbescherming en schort met lange mouwen kunnen vervallen

Vraag VWS: verstrekken PBM voor medisch kwetsbaren in de thuissituatie:

- › Mantelzorgers met luchtwegklachten: mondneusmasker van belang
- › Personen met ernstige immuunstoornis kunnen bij hoge infectiedruk overwegen mondneusmasker te dragen in openbare ruimten



Basisadviezen

- › Generieke adviezen voor luchtweginfecties (handen wassen, hoest/nies in elleboog en ventileren): blijven belangrijk
- › Corona specifieke maatregelen: blijf thuis bij klachten, doe een zelftest en ga in isolatie bij een positieve test → vervallen voor het algemeen publiek
- › Voorstel aanvulling generieke adviezen: blijf, indien mogelijk, thuis als je je ziek voelt bij een luchtweginfectie, vermijd contact met mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop



Past meldingsplicht groep A nog bij de huidige fase?

- > Zolang landelijke regie en de mogelijkheid om landelijk te kunnen ingrijpen met maatregelen noodzakelijk is → groep A meldingsplicht
- > Indien WHO bepaald geen PHEIC meer → groep A niet meer proportioneel
- > Advies aan VWS: voorbereidingen treffen om af te schalen
 - Afschalen naar groep B of lager of volledig afschaffen meldingsplicht, conform influenza
 - Voorwaarde: surveillance goed borgen