




Impact stopzetten AZ <60 jr

Op basis van S&OP week 14



Gevolg van stopzetten AZ <60 jaar voor afronding 1e prikken

- In de huidige planning worden nog 8.1M eerste prikken gezet, waarvan 1,1M (13%) AstraZeneca
- Bij het stopzetten van eerste prikken voor doelgroepen onder de 60 jaar neemt het gebruik van AstraZeneca af
- De afname, ongeveer 950K, moet worden ingevuld met andere vaccins
- De geplande wekelijkse aanvoer van vaccins (excl. AZ) bedraagt eind Juni / begin Juli 1,4M – 1,5M doses per week
- Dit betekent dat er één extra week vaccin toelevering nodig is om het gemis van AstraZeneca vaccins aan te vullen
- De einddatum van de laatste doelgroep (1982 t/m 2003) verschuift hierdoor 1 week naar achteren**
- Dit blijkt ook uit de uitgevoerde modellering (zie hiernaast):
 - De einddatum 1^e prik wordt nu week 27
 - Op afronding van 2^e prikken is er een positief effect: deze vervroegt van week 38 naar week 33
 - De start week per doelgroep blijft ongewijzigd



In het diagram is de impact op einddatum per doelgroep ten opzichte van het basis scenario weergegeven:

- Eerder klaar: balkje links van de 0, negatief aantal weken
- Later klaar: balkje rechts van de 0, positief aantal weken



Impact op eerste prikken van alleen >60 AZ, 1 week voor het hele programma

Doelgroepen	Prio	Start wk	100% Prik 1	100% Prik 2
Zorgmedewerkers directe COVID-zorg	1	1	1	4
Zorgmedewerkers verpleeghuizen	2	1	5	9
Bewoners instelling met instellingsarts	3	3	5	19
Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	4	3	5	9
Bewoners instelling met huisarts	5	3	18	23
Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	6	7	7	11
1936 of eerder (85+)	7	4	9	14
BES/CAS (1960 of eerder (60+) en zorgmedewerkers)	8	7	12	18
1937 t/m 1941 (80-84 jr)	9	7	11	16
1947 t/m 2003 (18-74 jr) met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	10	9	17	21
1956 t/m 1960 (60-64jr)	11	7	19	30
1942 t/m 1946 (75-79 jr)	12	12	16	21
1947 t/m 1951 (70-74 jr)	13	16	18	23
1952 t/m 1955 (65-69 jr)	14	18	21	32
Intramurale ggz-cliënten en medewerkers	15	8	14	24
Zorgmedewerkers langdurige zorg	16	6	21	25
Niet mobiele thuiswonende patiënten	17	-	-	-
1961 t/m 2003 (18-59 jr) met medische indicatie (overig)	18	17	24	29
1961 t/m 1971 (50-59 jr) zonder medische indicatie	18	19	24	29
BES/ CAS 1961 t/m 2003 (18-60 jr)	19	13	23	23
1972 t/m 1981 (40-49 jr) zonder medische indicatie	20	23	25	30
1982 t/m 2003 (18-39 jr) zonder medische indicatie	21	25	27	33
Ziekenhuismedewerkers		13	18	24

A: 3 week vertraging voor de groep 1961-2003 met een medische indicatie

B: 1 week vertraging op de laatste doelgroep en daarmee het hele programma voor eerste prikken: 1982 – 2003 zonder medische indicatie

C: Door het verminderde gebruik van AstraZeneca verlaagd de doorlooptijd tweede prikken als gevolg van de langere doorlooptijd tussen eerste en tweede prik voor AZ (vooralsnog)



Impact op 1^e prikken door stopzetten Janssen, vertraging 6 weken

Doelgroepen	Prio	Start wk	100% Prik 1	100% Prik 2
Zorgmedewerkers directe COVID-zorg	1	1	1	4
Zorgmedewerkers verpleeghuizen	2	1	5	9
Bewoners instelling met instellingsarts	3	3	5	19
Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	4	3	5	9
Bewoners instelling met huisarts	5	3	18	23
Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	6	7	7	11
1936 of eerder (85+)	7	4	9	14
BES/CAS (1960 of eerder (60+) en zorgmedewerkers)	8	7	12	18
1937 t/m 1941 (80-84 jr)	9	7	11	16
1947 t/m 2003 (18-74 jr) met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	10	9	17	21
1954 t/m 1960 (60-66jr)	11	7	20 A	31
1942 t/m 1946 (75-79 jr)	12	12	16	21
1947 t/m 1951 (70-74 jr)	13	16	18	23
1952 t/m 1953 (67-69 jr)	14	18	19	24
Intramurale ggz-cliënten en medewerkers	15	8	14	14
Zorgmedewerkers langdurige zorg	16	6	21	25
Niet mobiele thuiswonende patiënten	17	-	-	-
1972 t/m 2003 (18-49 jr) met medische indicatie (overig)	18	20 (+3)	23 (-1) A	28
1961 t/m 1971 (50-59 jr) met en zonder medische indicatie	18	19	25 (+1)	31
BES/ CAS 1961 t/m 2003 (18-60 jr)	19	13	25 (+2)	30
1972 t/m 1981 (40-49 jr) zonder medische indicatie	20	25 (+2)	27 (+2)	33
1982 t/m 2003 (18-39 jr) zonder medische indicatie	21	27 (+2)	33 (+6) B	39
Ziekenhuismedewerkers		13	18 B	24 C

A: Wijziging groepsgrote zorgt voor versnelling.

Geboortjaar 1954 en 1955 wordt geprikt door Huisartsen met AstraZeneca (ipv bij GGD met Pfizer en Moderna)

Groep 50-59 met medische indicatie wordt tegelijk geprikt met 50-59 zonder medische indicatie bij de GGD.

B: Vertraging in diverse doelgroepen door verminderd beschikbaar vaccine (geen Janssen)

C: Diverse 2^e prikken verschoven door allocatie ander vaccine en door versnelling/vertraging 1^e prikken



Gevolg van stopzetten Janssen op korte termijn, moet nog in detail herpland worden

Reeds ingeplande subdoelgroepen

Omschrijving Subdoelgroep	# mensen	Vaccin	Uitvoeringspartner	Start 1ste prik	Klaar 1ste prik	Klaar 2de prik
Medewerkers acute zorg	115	Janssen	Ziekenhuizen	wk16	wk18	n/a
GGZ	35	Janssen	Instellingen	wk16	wk16	n/a
GGZ met WLZ-indicatie	4,4	Janssen	Thuisvaccinatie	wk16	wk16	n/a
Ambassades	2,5	Janssen	tbd	wk16	wk16	n/a
Defensie < 60 met medische indicatie	4,5	Janssen		wk18	wk18	n/a
DJI met medische indicatie	1,3	Janssen	Huisarts	wk17	wk24	n/a
DJI zonder medische indicatie	9,5	Janssen		wk18	wk18	n/a

- 170K vaccines gepland op korte termijn (tussen week 16 t/m 18) die impact hebben op doelgroepen in de vorige slide